

Ths Lê Thị Đình - Khoa ICU

Theo một nghiên cứu được công bố trên số ra tháng 8 /2014 của tạp chí Critical Care Medicine, bệnh béo phì có thể chặt chẽ tới tỉ lệ tử vong sau 1 năm ở bệnh nhân nhồi máu khuỷu huyết nhập viện tới các đơn vị chăm sóc đặc biệt.

Bởi vì béo phì thường liên quan đến kết cục sức khỏe tồi tệ hơn, nhưng kết quả này có thể làm nhiễu loạn kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, Hallie C. Prescott, Bác sĩ chuyên khoa và lãnh vực chăm sóc đặc biệt và bệnh phổi tại Đơn vị Hồi sức Y khoa Michigan và đồng nghiệp lập luận rằng những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng béo phì có thể giúp bệnh nhân vượt qua bệnh tật nghiêm trọng khi bệnh tiến triển. Nhồi máu khuỷu huyết có mức tử lệ tử vong cao, và những bệnh nhân sống sót thường đòi hỏi chăm sóc bổ sung và phức tạp hơn cho năng lực chữa trị.

"Các bác sĩ nghĩ rằng các trường hợp nhập viện nhồi máu khuỷu huyết ở bệnh nhân béo phì trên nên tồi tệ hơn và niềm tin này có thể ảnh hưởng đến việc chăm sóc và tốn kém cho các bệnh nhân và gia đình họ", Bác sĩ Prescott cho biết trong một thông cáo báo chí của một trường đại học. "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy bệnh nhân béo phì ở bệnh nhân nhồi máu khuỷu huyết thực sự có tử lệ tử vong thấp hơn bệnh nhân cân nặng bình thường."

Béo phì liên quan cái thiên thì là thì vong để bổnh nhân nhiêm khuên huyên t

Viêt bái Biên tập viên

Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 19:45 - Làn cáp nhật cuối Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 19:50

