


Ths Lê Thị Đình - Khoa ICU

ĐẶT VẤN ĐỀ

Một loạt các trường hợp và thử nghiệm đã chứng minh rằng cho thấy liều pháp thay huyết tương (TPE = Therapeutic Plasma Exchange) đã cải thiện các tình trạng đông máu cũng như huyết động và có thể cải thiện còn cả bệnh nhân trong nhồi máu khu vực huyết não. Tuy nhiên, vai trò chính xác của TPE trong trường hợp nhồi máu khu vực huyết não vẫn còn chưa rõ ràng.

PHƯƠNG PHÁP

Chúng tôi thực hiện một nghiên cứu quan sát đơn trung tâm hồi cứu với việc sử dụng TPE như một liều pháp giảm tải cho 23 bệnh nhân liên tiếp được chẩn đoán nhồi máu khu vực huyết não hoặc sốc nhồi máu khu vực từ năm 2005 đến năm 2012. Các biểu hiện và hội chứng suy đa tạng (MOFS = Multiple Organ Failure Syndrom) trước, trong và sau khi TPE cũng như thời gian sống cũng được báo cáo.



KẾT QUẢ

Điểm SOFA trung bình là 13 (điểm lệch chuẩn [SD] 4) và điểm trung vị của suy đa tạng là 5 (khoảng tứ phân vị [IQR] 4-5). TPE được thực hiện 3 ngày (IQR 2-10) sau khi khởi phát triệu

2 / 2