

Khoa Sản

Cùng đũa là nĩa bám chặt âm đạo vào tử cung theo nên một đường vòng cung tạo ra các gợn sóng khá mong manh ngăn cách giữa âm đạo và bàng quang, tử cung và tử cung với tử cung với trí của đường vòng cung mà có cùng đường trục, cùng đường sau và cùng đường hai bên.

Ngoài nhiễm trùng ngăn cách và gợn sóng giữa âm đạo với niệu đạo và sinh vật và phần trong bàng quang là nĩa vô khuẩn, cùng đũa còn là nĩa góp phần làm cho đáy chậu dưới cùng của tử cung liên tục thay đổi xu hướng phát triển các tử cung trong bàng quang. Cùng đũa cũng còn là cái móc giữ phần hay là của ngõ để cho các bác sĩ đỡ nhũ, can thiệp vào trong bàng quang trong chẩn đoán cũng như điều trị: ví dụ như phẫu thuật cắt tử cung ngoài âm đạo, chọc dò túi cùng Douglas .v.v.... Một khác, trong quan hệ tình dục, cùng đũa sau còn là trục đường nghề nghiệp đầu tiên của tình trùng trước khi đi qua cửa tử cung để vào đường bên trong.



Với các chức năng khá quan trọng như vậy, tuy nhiên đây chỉ là nĩa bám vào của thành âm


Rách cùng đờ sau quan hệ tình dục - cách xử trí và phòng tránh

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 25 Tháng 1 2016 10:30 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 25 Tháng 1 2016 10:34

Đờ o, cho nên cơ u tử o cạ cùng đờ cũng khá mong manh, đờ bở tởn thỏỏ ng đờ c biẻt là khi thỏ c hiẻn các hành vi tình dỏ c không phù hỏ p. Mỏt trong nhỏ ng tởn thỏỏ ng đó, khá phỏ biẻn là rách cùng đờ sau quan hệ tình dỏ c.

Nguyên nhân cạ rách cùng đờ khá đa đỏ ng, có thỏ do tình trỏ ng khô ẩm đờ o (phỏ nỏ mỏ c bỏ nh viêm nhiỏ m ẩm đờ o, hoỏ c là ỏ các phỏ nỏ lỏ n tuỏ i); hoỏ c do cạ quan sinh dỏ c chỏ a phát triẻn hoàn thiẻn ỏ các bé gái vỏ thành niẻn; do sỏ chun giãn cạ ẩm đờ o không tỏ t (phỏ nỏ lỏ n tuỏ i, mỗn kinh); do quan hệ quá mỏ nh mỏ, thô bỏ o vỏ i các tỏ thỏ quan hệ khác thỏỏ ng, không phù hỏ p (đờ c biẻt là quan hệ tỏ phía sau); hoỏ c do đỏỏ ng vỏ t có kích thỏỏ c quá lỏ n; ngoài ra còn có thỏ do cỏỏ ng dỏm, bỏ o dỏm, hoỏ c thỏ dỏm vỏ i các vỏ t đỏỏ ng không phù hỏ p, vỏ t đỏỏ ng quá lỏ n, thỏ c hiẻn quá mỏ nh, thiỏ u kiỏ m soát ..v.v..; hiỏ m gỏ p hỏ n là do ẩm đờ o đỏ đỏ ng, có nhỏ ng vách ngăn hoỏ c cơ u tử o ẩm đờ o quá ngỏ n ..., nhỏ ng trỏỏ ng hỏ p đó thì phỏ i khám chuyên khoa mỏ i có thỏ xác đỏ nh đỏỏ c.



Bỏ phỏ n sinh dỏ c nỏ gỏ i

Khi cùng đờ bở tởn thỏỏ ng, tùy theo mỏ c đờ mà biẻ u biẻn qua các triẻ u chỏ ng, nhỏ ng dù cho

Rách cùng đờ sau quan hệ tình dục - cách xử trí và phòng tránh

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 25 Tháng 1 2016 10:30 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 25 Tháng 1 2016 10:34

Mặc dù như thế nào đi nữa thì triệu chứng đau đầu tiên mà người phụ nữ nhận biết được là cảm giác đau đớn sâu bên trong âm đạo kèm theo tình trạng ra máu. Ban đầu có thể ra từng ít một, nhưng liên tục, không ngừng tở nên mất khả năng đông lại bên trong âm đạo. Có những bệnh gái chửa có kinh nghiệm và liên quan đầu tiên quan hệ nên nghĩ những máu này do màng trinh bị rách, nhưng thực sự không phải như vậy: màng trinh rách sẽ ra máu rất ít, đôi khi chỉ là một vệt máu nhỏ, và cảm giác đau thì đôi khi chỉ cảm nhận được khi đang quan hệ, khi kết thúc thì không còn đau nữa, ngược lại khi rách cùng đờ thì cảm giác đau mãi lúc mất tăng.

Tên triệu chứng cùng đờ có nhiều mức độ, mức độ có biểu hiện lâm sàng khác nhau, nếu như chỉ bị xây xước nhẹ thì có cảm giác nóng rát âm đạo kèm máu ra ít, có thể tạm cảm mà không cần can thiệp. Tuy nhiên có những triệu chứng nặng nề như rách rộng, rách sâu, rách phức tạp hoặc có thể rách nhiều chỗ, có triệu chứng hẹp qua lỗ rách có thể lõm cụt ... ruột non. Những triệu chứng hẹp như vậy có thể có choáng mất máu, đe dọa tính mạng, có nguy cơ nhiễm trùng rất cao và đau đớn rất nhiều.

Đúng triệu chứng các tình huống này, điều đầu tiên là phải viết báo ngay lập tức mức độ nặng nề và đi ngay đến gặp bác sĩ chuyên khoa phụ sản để được khám và xác định nguyên nhân và mức độ, điều tiếp theo là phải trung thực nói cho bác sĩ biết rằng mình mới và quan hệ tình dục hoặc đã thử dâm với một đấng nào đó... để bác sĩ để tên nhiều thời gian tìm nguyên nhân và để phát hiện các triệu chứng phụ hẹp.

Tùy theo mức độ triệu chứng, bệnh nhân có thể được xử trí tại phòng thủ thuật hay phòng mổ, người bệnh được nằm ở tư thế sản khoa, bác sĩ cùng người phụ nữ cùng để bị rách bằng 2 van âm đạo, sau khi thăm sát mức độ, sát khuẩn, bác sĩ tiến hành khâu phức tạp vết rách cùng đờ bằng chỉ tiêu 2-zero hoặc 3-zero (chromic hoặc vicryl) với mũi khâu rời hoặc khâu vết. Sau khi khâu xong, người bệnh có thể xuất viện sau 2 đến 3 ngày điều trị và theo dõi.

Ngoài ra, trong triệu chứng hẹp bệnh nhân có tình trạng thiếu máu do chảy máu quá nhiều, thì được truyền máu hoặc các chế phẩm thay thế.

Một điều cần phải chú ý nữa là hầu hết các triệu chứng hẹp bị rách cùng đờ sau giao hợp, người phụ nữ rất ngại và xấu hổ khi đến bác sĩ, điều này làm cho tình trạng chảy máu kéo dài gây mất máu, rời lỗ đẻ máu và tăng nguy cơ nhiễm trùng, nặng nề hơn là nguy hiểm đến tính mạng làm cho việc xử trí có phần khó khăn và vất vả hơn. Vì thế, bệnh nhân cần phải dũng cảm đi đến với sự thật và đi ngay đến bác sĩ chuyên khoa, phải thành thật trình bày nguyên nhân. Luôn đúng như nhiên, bác sĩ cùng các nhân viên cấp trên bao giờ cũng giữ gìn sự bí mật cho bệnh nhân,

Rách cùng đờ sau quan hệ tình dục - cách xử trí và phòng tránh

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 25 Tháng 1 2016 10:30 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 25 Tháng 1 2016 10:34

và kín đáo trong thăm khám cũng như trong phẫu thuật.

Rách cùng đờ là một “sự cố” ngoài ý muốn không hề như những gì đồn thổi khêu gợi sinh sôi trên các mạng xã hội, tuy nhiên sau khi phẫu thuật xong cần chú ý giữ gìn vết khâu bằng cách quan hệ nhẹ nhàng, tiếp tục phù hợp và phải sau ít nhất 2 tuần sau xảy ra “sự cố” này.

Để phòng tránh tình trạng rách cùng đờ cần chú ý những điểm sau: trong quan hệ tình dục phải nhẹ nhàng, cùng trao đổi, chia sẻ nhau những tiếp xúc phù hợp, không nên “vào trôn” quá nhanh mà phải có “khúc dạo dờ” để tăng tính hưng phấn cho người phụ nữ, vì khi đó âm đạo sẽ dần nở to và tiếp xúc dễ dàng hơn cho nên sẽ hạn chế sang chấn, hạn chế tổn thương đa phần có thể các hình thức thủ dâm.

Một điểm đáng bàn nữa là sau khi được khâu lại vết rách cùng đờ, đa số người phụ nữ có tâm trạng lo lắng, sợ hãi, sợ tái diễn tình trạng này mới khi quan hệ, đây là một tình trạng tâm lý mang tính “ám ảnh” có thể dẫn đến một hậu quả phức tạp trong chuyện gối chăn, hay còn gọi là “lãnh cảm tình dục”. Những “điểm u khó nói” này đã vô tình làm suy giảm chất lượng cuộc sống và hậu quả phức tạp gia đình. Bác sĩ cũng như nhân viên y tế phải giải tỏa tâm lý cho người bệnh bằng cách tận tâm tận tình, hướng dẫn chu đáo cách chăm sóc và phòng tránh, nên thiết lập một mối liên hệ chặt chẽ giữa thầy thuốc và người bệnh để họ có thể cảm thấy thoải mái và trong mọi thời điểm mà họ cần. Một khác người bệnh cũng cần phải tiến hóa giải nỗi sợ hãi của mình cùng với người bệnh để sàng lọc những người bạn an toàn, đồng viên, bằng hành động, bằng tình yêu và trách nhiệm.

Tình dục là cảm giác thăng hoa tự nhiên của cơ thể sống, giúp giải tỏa các căng thẳng, duy trì trạng thái cân bằng sinh lý và tinh thần của con người, duy trì hậu quả gia đình và duy trì nòi giống. Do đó, việc hiểu biết để phòng tránh các “sự cố” khi quan hệ tình dục có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp tiếp cận cho người phụ nữ, tiếp cận “lửa” cho tình yêu, thêm “năng lượng” cho hậu quả phúc và giúp cho “chuyện này” đem đến luôn là hạnh phúc của cuộc đời.