

Bs Trần Vũ Kiệt - Khoa ICU

I. TÁC ĐỘNG CỦA NHIỄM KHUẨN BỆNH NHÂN.

- Tăng sử dụng kháng sinh
- Tăng đề kháng kháng sinh
- Tăng chi phí điều trị
- Tăng thời gian nằm viện

II. NGUY CƠ NKBV TRÊN BỆNH NHÂN CÓ LỌC MÁU LIÊN TỤC.

A. Nguy cơ NKBV có thể từ nguồn nội sinh và ngoại sinh


1. Nguồn ngoại sinh

- Catheter đường
- Hệ thống lọc
- Quạt lọc
- Nồng độ chảy CRRT
- Kiểm soát đường, chăm sóc catheter

Phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết trên bề mặt nhân lọc máu liên tục

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 19 Tháng 9 2016 20:04 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 19 Tháng 9 2016 20:21



2. Nếu người bệnh nằm trong CRRT thì không thể dùng máy lấy máu catheter vào trong lòng mạch
a.2. Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn huyết liên quan đến CRRT là gì?
a.3. Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn huyết liên quan đến CRRT là gì?
a.4. Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn huyết liên quan đến CRRT là gì?
a.5. Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn huyết liên quan đến CRRT là gì?
a.6. Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn huyết liên quan đến CRRT là gì?
a.7. Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn huyết liên quan đến CRRT là gì?
a.8. Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn huyết liên quan đến CRRT là gì?
a.9. Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn huyết liên quan đến CRRT là gì?
a.10. Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn huyết liên quan đến CRRT là gì?