


Ung thư bàng quang

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 04:52 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 05:27

Bs Phạm Ngọc Na - Khoa Ung bướu

Ung thư bàng quang bắt đầu khi các tế bào trong bàng quang phát triển không kiểm soát được. Khi các tế bào ung thư phát triển nhiều tạo thành khối u và lan rộng đến các cơ quan khác trong cơ thể



DỊCH THỊ

Theo ước tính có khoảng 72570 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư bàng quang vào năm 2013, 15210 người chết vì căn bệnh này ở Hoa Kỳ và hơn 385000 người được chẩn đoán ung thư bàng quang mỗi năm trên toàn thế giới. Tỷ lệ mắc bệnh nam và nữ là 3:1. Ung thư bàng

Ung thư bàng quang

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 04:52 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 05:27

quang đường thông thường trong các bệnh ung thư ở nam giới và thường hiếm gặp ở nữ giới.

YÊU TỐ NGUY C



Hút thuốc lá - nguyên nhân gây ung thư bàng quang

1. Hút thuốc lá: hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây nên ung thư bàng quang. Người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư bàng quang cao gấp 3 lần so với người không hút thuốc. Hút thuốc lá là nguyên nhân gây ung thư bàng quang ở cả hai giới với tỷ lệ 50%. Có mối quan hệ trực tiếp giữa thời gian hút và số lượng thuốc lá với sự gia tăng ung thư bàng quang cả về bào chồi và tế bào vảy.

2. Yếu tố nghề nghiệp: người lao động tiếp xúc với hóa chất công nghiệp có các amin thơm như thuốc nhuộm, cao su, da, dệt may và sơn làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang.

3. Thuốc giảm đau: lạm dụng thuốc giảm đau chủ yếu là paracetamol làm tăng nguy cơ ung

Ung thư bàng quang

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 04:52 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 05:27

thể tiết niệu, đặc biệt là bệnh

4. Các nguyên nhân do điều trị: điều trị xạ trị vùng chậu hoặc hóa chất cyclophosphamide tăng nguy cơ ung thư tiết niệu

5. Kích thích bàng quang mãn tính và nhiễm trùng: nhiễm trùng tiết niệu, sỏi thận, sỏi niệu quản trong thời gian dài và các nguyên nhân khác gây kích thích bàng quang mãn tính như nhiễm sản mủ cũng gây ung thư bàng quang (ung thư tế bào vảy)

6. Thiazolidinediones bao gồm pioglitazone và rosiglitazone là hai thuốc điều trị đái tháo đường type 2 cũng làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang. Vào tháng 6 năm 2011 FDA (the U.S Food and Drug Administration) cảnh báo sử dụng pioglitazone (actor) nhiều hơn 1 năm làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang.

7. Acid aristolochic có thể tìm thấy trong thảo mộc Trung Quốc làm tăng nguy cơ ung thư tiết niệu bao gồm ung thư bàng quang

8. Nhiễm ung thư nhiễm asen: Dịch tễ học cung cấp bằng chứng vững chắc về nguy cơ gây ung thư cổ a asen trong đó có ung thư bàng quang.

9. Ung thư đường tiêu hóa không polyp di truyền (HNPPC): có liên quan chặt chẽ với đường tiêu hóa và nhiễm mủ cũng. Nhiễm ngấm ở bệnh nhân này có nguy cơ ung thư bàng quang cao

10. Bệnh Cowden gây ra bởi đột biến gen PTEN liên quan chặt chẽ với các bệnh ung thư vú và tuyến giáp. Nhiễm ngấm ở bệnh nhân này cũng có nguy cơ cao bệnh ung thư bàng quang.

Nguồn: Clinical Oncology, fourth edition