


Bs Nguyễn Ngọc Tân -

I/ Tổng quan:

Rò rỉ tĩnh mạch màng cứng tủy sống (spinal Dural ArterioVenous Fistulas – sDAVF) chiếm khoảng 50-85% các rối loạn mạch máu cột sống. sDAVF là bệnh lý mạch máu hiếm, đặc trưng bởi sự thông nối bất thường giữa động mạch và tĩnh mạch. Bệnh thường biểu hiện triệu chứng ở độ tuổi trung niên, với biểu hiện tê, yếu 2 chi dưới hoặc chi trên đơn lẻ. Sinh lý bệnh của sDAVF xuất phát từ sự tăng áp lực trong hệ thống tĩnh mạch dưới, tác động đến tĩnh mạch và thiêu máu tuỷ. Nếu không điều trị có thể gây di chứng yếu liệt suốt đời. Chẩn đoán sDAVF dựa trên tiêu chuẩn vàng là chụp mạch số hóa xóa nền. Các khảo sát cận lâm sàng khác có thể hỗ trợ vì tính đóng vai trò hỗ trợ trong tiếp cận ban đầu.

Hiện tại, sDAVF có thể điều trị bằng phẫu thuật hoặc can thiệp nội mạch, xoay quanh mục tiêu là phá bỏ sự thông nối giữa động mạch và tĩnh mạch bất thường, bên cạnh việc theo dõi cấu trúc tuỷ và sự tưới máu tuỷ sống. Điều trị sớm tránh khi sDAVF tiến triển gây di chứng vĩnh viễn là yếu tố quyết định giúp người bệnh có thể phục hồi chức năng thần kinh.



[Xem tiếp tại đây](#)