


Bs Nguyễn Quốc Việt -

Sỏi tiết niệu là bệnh khá phổ biến ở Việt Nam, chiếm 40-50% các bệnh nhân có bệnh lý hệ tiết niệu, thường gặp ở độ tuổi từ 30-60 tuổi và có hai giới, trong đó sỏi đài bể thận chiếm khoảng 70-75%. Các bệnh nhân thường gặp do sỏi tiết niệu là sỏi niệu c, sỏi niệu thận, áp xe thận, suy thận...

Có nhiều phương pháp điều trị sỏi tiết niệu trong đó tán sỏi thận qua da là một phương pháp có chi phí rẻ và hiệu quả cao. Fernstrom và Johansson là những người đầu tiên mô tả kỹ thuật tán sỏi thận qua da (PCNL) vào năm 1976. Việc dự đoán trước kết quả phẫu thuật và tỷ lệ thành công và bệnh nhân cần tán sỏi đã thu hút sự chú ý của các bác sĩ tiết niệu trong những năm gần đây. Một số mô hình dự đoán đã được đề xuất nhằm tiên lượng hiệu quả tán sỏi. Rosette và cộng sự phân loại sỏi thận dựa trên “trọng tải” sỏi và tìm thấy mối tương quan đáng kể giữa “trọng tải” sỏi và thời gian phẫu thuật. Mishra và cộng sự đã đưa ra phương pháp đánh giá thời gian sỏi bệnh nhân nằm trên chụp cắt lớp vi tính (CLVT) hệ tiết niệu.



[Xem tiếp tại đây](#)