

Ths.Bs Nguyễn Xuân Lâm -


I. ĐỊNH NGHĨA

Túi thừa ruột non là bệnh lý hiếm gặp với tần suất chung khoảng 1-2%. Túi thừa ruột non có thể được phân loại tùy theo bệnh học, hình thái, vị trí, biểu hiện lâm sàng triệu chứng và biến chứng. Chúng thường không có triệu chứng và được phát hiện tình cờ trên pho ảnh tiêu chuẩn chẩn đoán hình ảnh, nội soi tiêu hóa, trong một số trường hợp khi xuất hiện các biến chứng như: viêm túi thừa, thủng, tắc ruột hoặc xuất huyết tiêu hóa.

II. DỊCH TỄ HỌC

Với số tiêu bản của pho ảnh tiêu chuẩn chẩn đoán hình ảnh, tần suất phát hiện tình cờ túi thừa ruột non đang tăng lên. Hiện tại, tần suất của túi thừa ruột non bẩm sinh và mắc phải khoảng 2-4% (hình 2.1).

Túi thừa Meckel là túi thừa bẩm sinh hay gặp nhất của ống tiêu hóa với tần suất gặp khoảng 2-4%.



Bình lý túi thỏ a ruột non

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 16 Tháng 12 2024 16:06 -

[Xem tiếp tại đây](#)