

BSCKI. Nguyễn Trung Hiếu -

1. ĐỀ I CẤP NG

Viêm tỵ xơ là tình trạng nhiễm trùng xảy ra do vi khuẩn hoặc các vi sinh vật khác gây ra. Trầm, đau họng máu là các triệu chứng gây bệnh quan trọng, đặc biệt trong các trường hợp nặng không có tiền sử chấn thương hoặc phẫu thuật tại vùng xảy ra bệnh. AHO thường xuất hiện cấp tính và có thể tiến triển nhanh nếu không được nhận biết và điều trị kịp thời.

AHO là một bệnh nhiễm trùng xâm lấn thường đi kèm theo các gờ p ở trẻ em, có thể gây biến chứng đáng kể và hồi phục chậm lành lâu dài. Mặc dù tiền lâm sàng nhìn chung tốt khi được chẩn đoán và điều trị sớm, bệnh vẫn có thể dẫn đến viêm tủy xương mãn tính, tái phát, rồi loét tăng trưởng hoặc tổn thương khớp.

Điễm khó trong thậ c hành là biậ u hiệ n ban đầ u cậ a bậ nh có thậ không điể n hình. Trậ có thậ chậ đầu mậ t vùng chi, đi khậ p khiệ ng hoặ c không chậ u vậ n đượ ng chi. Sậ t có thậ không rõ và X-quang ậ giai đoặ n sậ m thậ ậ ng chậ a có biậ n đầ i đượ c hiệ u. Chính vì vậ y, AHO cậ n đượ c đầ t ra trong chậ n đoán phân biậ t ậ trậ có đau xậ ậ ng khu trú không giậ i thích đượ c, đượ c biậ t khi kèm sậ t hoặ c hậ n chậ vậ n đượ ng.

Trong những năm gần đây, chẩn đoán lâm sàng đoán và điều trị AHO đã có nhiều thay đổi. Hội đồng dân PIDS/IDSA năm 2021 nhấn mạnh hơn vai trò của MRI, xét nghiệm PCR từ bệnh phẩm xẹp, điều trị kinh nghiệm có cân nhắc MRSA và đặc biệt là chuyên sử dụng thuốc kháng sinh tĩnh mạch sang đường uống ở bệnh nhân ổn định.



Viêm tỵ x huyết ng đ ng máu c p tính ở trẻ em

Viết bởi Biên tập viên
Thứ ba, 25 Tháng 8 2026 14:21 -

[Xem tiếp tại đây](#)