

Bs Huân Nh Ngoc Tin - Khoa Nội thận-nội tiết

I. ĐỊNH NGHĨA:

Thuật ngữ “Bệnh cơ u thận đái tháo đường” chỉ bệnh lý cơ u thận thứ phát do ảnh hưởng của đái tháo đường (ĐTĐ) lên thận. Tên thông thường của bệnh này có hình thái đặc trưng của Kimmelstiel và Wilson mô tả năm 1936.


Theo dõi các biến chứng của ĐTĐ, gặp microalbumin niệu ở 40% bệnh nhân bị ĐTĐ dưới 5 năm và 49% bệnh nhân ĐTĐ trên 5 năm.

Bệnh cơ u thận đái tháo đường được xác định do thay đổi thành phần hóa học của màng đáy cơ u thận và tăng cường gian mô ch. Phân tích hóa sinh và hóa miễn dịch cho ra rằng chất mô ngoài tế bào (extracellular matrix: ECM) của gian mô ch cơ u thận bao gồm collagen typ IV, laminin và fibronectin.

Bệnh cơ u thận dài tháo đường

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 19 Tháng 1 2014 21:25 - Lần cập nhật cuối Chỉnh sửa, 19 Tháng 1 2014 21:57



Đường huyết lúc đói (mmol/l) 4,4 - 6,1 ≤ 7,8 > 7,8

	Tốt	Trung bình	Kém
Đường huyết lúc đói (mmol/l)	4,4 - 6,1	≤ 7,8	> 7,8
Đường huyết sau ăn (mmol/l)	4,4 - 8,0	≤ 10,0	> 10,0
HbA1c	< 6,5	≤ 7,5	> 7,5

Tác động rất chậm của insulin có thể dẫn đến tình trạng hạ đường huyết, đặc biệt là ở bệnh nhân tiểu đường type 1. Việc sử dụng insulin cần được theo dõi chặt chẽ để tránh tình trạng này.