

Bệnh do Vibrio Vulnificus

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 19 Tháng 5 2026 09:59 -

BS. Nguyễn Thị Thùy Nhung -

Đ I C NG

Giống như các loài vi khuẩn Vibrio khác, *V. vulnificus* là một phần của hệ vi sinh vật biển bình thường và, ở các vùng ôn đới, chỉ đột ngột bùng phát cao độ gây bệnh lâm sàng trong những tháng ấm hơn trong năm. Hầu hết hầu hết các thu hoạch vào mùa hè từ vịnh Chesapeake đều chứa mầm bệnh này, cũng như 10% cua. Tại Hoa Kỳ, 25% tổng số ca nhiễm Vibrio là do nguồn không phải thực phẩm gây ra, và trong số đó, *V. vulnificus* là loài được phân lập phổ biến nhất. Gần một nửa số ca nhiễm *V. vulnificus* không phải do thực phẩm gây ra. Sau cơn bão Katrina năm 2005, đã có 18 trường hợp nhiễm trùng vết thương do vi khuẩn Vibrio được báo cáo; 14 trường hợp (82%) là do *V. vulnificus* gây ra, dẫn đến ba trường hợp tử vong. Các trường hợp nhiễm trùng do *V. vulnificus* có thể đang gia tăng ở Hoa Kỳ, đặc biệt là liên quan đến việc tiêu thụ hầu hết vùng Vịnh Mexico, nhiệt độ nước ấm hơn (>22°C) và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Hơn 80% các trường hợp nhiễm *V. vulnificus* được báo cáo ở Hoa Kỳ phải nhập viện; tỷ lệ tử vong là 30%, cao nhất trong số các bệnh nhiễm trùng do bất kỳ loài Vibrio nào gây ra. Vi khuẩn *V. vulnificus* được ước tính chiếm đến 90% tổng số ca tử vong liên quan đến hệ thống Hoa Kỳ. Hippocrates có thể đã mô tả lần đầu tiên về nhiễm trùng *V. vulnificus* vào thế kỷ 5 trước Công nguyên khi ông miêu tả số triệu chứng nhanh chóng của bệnh viêm mô tế bào bàn chân nghiêm trọng với các vết phồng rộp đen ở Criton ở Thasos, dẫn đến tử vong trong vòng 48 giờ.

Bệnh do Vibrio Vulnificus

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 19 Tháng 5 2026 09:59 -



[Xem tiếp tại đây](#)