

Bs Huân Nh Ng c Tin -

1. Các khuyến nghị

2.29a Bệnh nhân tuở i hi n t i, t t c nh ng ng i đ c ch n đoán m c b nh ti u đ ng trong 6 tháng đ u đ i đ u nên đ c xét nghi m gen đ phát hi n b nh ti u đ ng s sinh.

2.29b Trẻ em và thanh thi u niên không có các đ c đi m đi n hình c a b nh ti u đ ng lo i 1 ho c lo i 2 và có ti n s gia đình m c b nh ti u đ ng qua nhi u th h (cho th y ki u di truy n tr i trên nhi m s c th th ng) nên đ c xét nghi m gen đ phát hi n b nh ti u đ ng khi phát t u i tr ng thành (MODY).

2.29c Trong c hai tr ng h p, nên tham kh o ý ki n c a trung tâm chuyên v di truy n h c b nh ti u đ ng đ hi u rõ ý nghĩa c a các đ t bi n gen và cách ti p c n t t nh t cho vi c đánh giá, đ u tr và t v n di truy n ti p theo.

Các khi m khu y t đ n gen gây r i lo n ch c năng t bào β (ví d : b nh ti u đ ng s sinh và MODY) ho c h i ch ng kháng insulin (ví d : ch ng lo n đ ng m đ n gen) xu t hi n m t ph n nh nh ng ng i m c b nh ti u đ ng ($<5\%$).

2. Ch n đoán b nh ti u đ ng đ n gen

Nên xem xét ch n đoán đái tháo đ ng đ n gen ở trẻ em và ng i l n đ c ch n đoán m c đái tháo đ ng ở giai đo n đ u tu i tr ng thành v i các đ u hi u sau:

B nh ti u đ ng đ c ch n đoán trong vòng 6 tháng đ u đ i.


Hội chứng đái tháo đường di truyền

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ 02, 02 Tháng 9 2026 08:24 -

Bệnh tiểu đường không có các đặc điểm điển hình của tiểu đường loại 1 hoặc loại 2 (âm tính với kháng thể tự miễn liên quan đến tiểu đường, không béo phì và thiếu các đặc điểm chuyển hóa khác, đặc biệt là tỉ lệ gia đình mà các bệnh tiểu đường).

Tăng đường huyết lúc đói ở mức nhẹ, nhẹ (100–150 mg/dL [5,6–8,5 mmol/L]), chỉ số A1C ở mức nhẹ từ 5,6 đến 7,6% (từ 38 đến 60 mmol/mol), đặc biệt nếu không bị béo phì.



[Xem tiếp tại đây](#)