

Bác sĩ Tr n Phúc Huy – Khoa Ngo i tiêu hóa

I. T NG QUAN

Teo đ ng m t b m sinh (Biliary Atresia - BA) là m t b nh lý đ ng m t ti n tri n và t c ngh n hi m g p tr s sinh, đ c tr ng b i s x hóa và h y ho i các đ ng m t trong và ngoài gan. Tình tr ng này đ n đ n s l u gi các ch t trong m t t i gan, gây vàng da m t, x gan m t và cu i cùng là suy gan giai đ n cu i n u không đ c đi u tr . Đây là nguyên nhân hàng đ u gây t vong do b nh gan tr em và là ch đ nh ph bi n nh t cho ghép gan trong đ tu i nhi khoa.





T n su t m c b nh teo m t b m sinh có s khác bi t rõ r t gi a các vùng đ a lý và s c t c. Khu v c Đông Á có t l cao nh t, dao đ ng t 1/5.000 đ n 1/10.000 tr sinh s ng (ví d t i Đài Loan và Nh t B n). Khu v c ph ng Tây (Châu Âu, B c M , Canada) có t l th p h n, kho ng 1/15.000 đ n 1/20.000 tr sinh s ng. T l cao nh t đ c báo cáo t i Polynesia thu c Pháp là 1/3.500. B nh g p n nhi u h n nam, v i t l n /nam kho ng 1,4–1,7/1 theo các báo cáo đ ch t h c l n t i châu Á và ph ng Tây.

Cho đ n nay, nguyên nhân chính xác c a teo đ ng m t v n ch a đ c xác đ nh rõ. Nhi u gi thuy t đ c đ a ra, bao g m: b t th ng phát tri n phôi thai c a h th ng đ ng m t, nhi m virus chu sinh, r i lo n mi n d ch, y u t di truy n, t n th ng viêm đ n đ n x hóa đ ng m t ti n tri n.... V m t b nh h c, t n th ng đ c tr ng là ph n ng viêm và x hóa lan t a đ ng m t ngoài gan, đ ng th i có s tăng sinh ng m t, m t và x hóa trong gan. Theo th i gian, tình tr ng này ti n tri n đ n x gan m t th phát và tăng áp l c tnh m ch c a.

Phân loại dựa trên mức độ xâm lấn

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 18 Tháng 9 2026 14:47 -



[Xem tiếp đây](#)