

Bs Lê Thị Ngọc Thành Vi -

I. ĐỊNH NGHĨA

Hội chứng giả tắc đởm tràng cấp tính (Acute Colonic Pseudo-Obstruction - ACPO), hay còn gọi là hội chứng Ogilvie, là một tình trạng cấp tính của ruột già giãn nở tiến triển cấp tính mà không có bệnh lý cơ học nào gây ra. Bệnh lý này thường khởi phát trên nhóm bệnh nhân có bệnh nền nội khoa nặng, sau các phẫu thuật lớn (chẩn đoán bệnh hình, phẫu thuật nội khoa, tim mạch) hoặc rối loạn chuyển hóa kéo dài. Nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời, áp lực lòng ruột tăng cao sẽ dẫn đến thiếu máu cục bộ thành ruột, hoại tử và thủng ruột, tỷ lệ tử vong lên tới 40% – 50%.

II. TRIỆU CHỨNG, CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng Lâm sàng

Bệnh cảnh lâm sàng của ACPO có biểu hiện như một ruột tắc hoặc thủng ruột nhưng xuất hiện trên các bệnh nhân đặc biệt (bệnh nhân nội mхи sхи, sau mổ, ngừng thở cao tuỵ sa sút trí tuệ).

- **Chẩn đoán bệnh:** Là triệu chứng phổ biến nhất (90% - 100% trường hợp), bệnh nhân căng đờ, gõ vang, tăng dần theo thời gian.
- **Đau bụng:** Đau âm ỉ lan tỏa, đau quặn từng cơn xảy ra khoảng 80% bệnh nhân.
- **Buồn nôn và nôn mửa:** Gặp khoảng 60% trường hợp do áp lực dạ dày - ruột tăng cao.
- **Rối loạn đại tiện:** Bí trung đại tiện là triệu chứng kinh điển, tuy nhiên có đến 40% bệnh nhân biểu hiện bằng tình trạng tiêu chảy giả (secretory diarrhea) do dịch bài tiết đường ruột quá mức phân tán.

[Xem tiếp tại đây](#)