Bs Lê Văn Tu□n -

Đây là m□t b□n tóm t□t nhanh c□a các h□□ng d□n mà không phân tích ho□c bình lu□n. Đ□ bi□t thêm thông tin, hãy truy c□p tr□c ti□p vào h□□ng d□n b□ng cách nh□p vào liên k□t trong tài li□u tham kh□o.

Vào tháng 2 năm 2020, m□t h□i th□o t□ Hi□p h□i Y h□c Chăm sóc tích c□c đã công b□ các h□□ng d□n đi□u tr□ th□c hành lâm sàng v□ suy gan c□p tính và đ□t c□p suy gan m□n tính □ ng□□i tr□□ng thành, nh□ đã g□p trong phòng chăm sóc đ□c bi□t (ICU) [1]

Drugs & Diseases > Medscape > Clinical Practice Guidelines

Liver Failure Management in the ICU: Clinical Practice Guidelines (2020)

Society of Critical Care Medicine

This is a quick summary of the guidelines without analysis or commentary. For more information, go directly to the guidelines by clicking the link in the reference.

February 28, 2020

0 Read Comments

- Đ□i v□i b□nh nhân suy gan c□p tính (ALF) ho□c đ□t c□p suy gan mãn (ACLF), d□ch tinh b□t hydroxyethyl không đ□□c khuy□n cáo cho h□i s□c truy□n d□ch ban đ□u.
- M□c tiêu huy□t áp đ□ng m□ch trung bình (MAP) là 65 mm Hg, v□i đánh giá đ□ng th□i t□□i máu, đ□□c đ□ xu□t cho b□nh nhân m□c ALF ho□c ACLF.
- □ nh□ng b□nh nhân m□c ALF ho□c ACLF có tình tr□ng h□ huy□t áp, h□i s□c truy□n d□ch không v□ bình th□□ng đ□□c thì norepinephrine đ□□c khuyên dùng nh□ m□t thu□c v□n m□ch đ□u tiên. Thu□c này cũng đ□□c khuy□n cáo trong các tr□□ng h□p ALF ho□c ACLF đ□□c đánh d□u b□ng h□ huy□t áp n□ng và gi□m t□□i máu mô, ngay c□ khi quá trình h□i s□c truy□n d□ch đang di□n ra.

- □ nh□ng b□nh nhân b□ b□nh nghiêm tr□ng v□i ALF ho□c ACLF đang tr□i qua các th□ thu□t xâm l□n, xét nghi□m (INR), ti□u c□u và fibrinogen, đ□ đánh giá nguy c□ ch□y máu.
- Trong th□i gian ch□ ghép gan, có th□ khuy□n ngh□ đi□u tr□ h□i ch□ng gan ph□i bao g□m chăm sóc h□ tr□ s□ d□ng oxy b□ sung.
- Khi h□i ch□ng gan th□n ti□n tri□n □ nh□ng b□nh nhân nguy k□ch v□i ACLF, nên s□ d□ng thu□c v□n m□ch.
- □ nh□ng b□nh nhân m□c ALF ho□c ACLF, nên s□ d□ng m□c tiêu đ□□ng huy□t trong huy□t thanh là 110-180 mg / dL.
- Khuy□n cáo r□ng b□nh nhân m□c ALF ho□c ACLF nên đ□□c sàng l□c các nguyên nhân gây suy gan do thu□c, v□i vi□c ng□ng s□ d□ng các lo□i thu□c đ□□c ch□ng minh ho□c nghi ng□ là ngu□n g□c c□a ALF ho□c ACLF.
- Đ□i v□i các thu□c di□u tr□ chuy□n hóa □ gan, nên di□u ch□nh li□u □ b□nh nhân m□c ALF ho□c ACLF, v□i các di□u ch□nh nh□ v□y đ□□c th□c hi□n theo ch□c năng gan còn l□i c□a b□nh nhân và s□ d□ng tài li□u t□t nh□t hi□n có. Nên tham kh□o v□i m□t d□□c sĩ lâm sàng, n□u có.

Ngu□n https://reference.medscape.com/viewarticle/925736

Tài li□u tham kh□o:

1. Nanchal R, Subramanian R, Karvellas CJ, et al. Guidelines for the management of adult acute and acute-on-chronic liver failure in the ICU: cardiovascular, endocrine, hematologic, pulmonary, and renal considerations. Crit Care Med. 2020 Mar;48(3):e173-91. https://journals.lww.com/ccmjournal/FullText/2020/03000/Guidelines_for_the_Management_of_Adult_Acute_and.29.aspx