


Bs CK1 Lê Văn Hiếu – Khoa Mắt

Ngày 28/05/2019, khoa Cấp Cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 1 trộm ng hóp bệnh nhân nam, 51 tuổi, bị ong đốt toàn thân, trong đó có 1 vết đốt vào mắt bên phải.

Bệnh nhân khai làm chột phát cây trong vườn nhà, do sơ ý đập trúng tổ ong. Đột ngột ngã i nhà chộp vào bệnh viện cấp cứu. Thời điểm đi khám bệnh, MP thấy AS (+), kết mạc充血, phù toàn bộ giác mạc, nhãn màng desemet, trung tâm giác mạc có mọt ngòi ong cắm sâu khoanh 2/3 bề dày.

Bệnh nhân được chuyển phòng mổ phẫu thuật lấy ngòi ong, được tra mắt Maxitrol x6 lần/ngày, Refresh tear x 6 lần/ngày, Fefasdin 60mg x 2 viên/ngày, kháng viêm tại chỗ và toàn thân. Sau 4 ngày đi u trộm, MP đỡ nhức, thấy tăng (ĐNT 2m), giác mạc giảm phù, nhưng phát hiện thêm tình trạng đục Thụ tinh thể. Bệnh nhân được ra viện, cho đến viện nhà và hẹn tái khám.



Ong đốt vào mắt là mọt tại nạn ít gặp, ong có thể đốt vào mi, kết mạc hoặc giác mạc. Trong đó, vết đốt vào giác mạc thường gây tổn thương nặng nề. Sau khi đốt ngòi ong thường bị đốt ra và lưu lại tại chỗ (gồm ngòi ong đâm vào và mọt túi chứa nước đục) do đó nước đục tiếp tục đâm vào tại chỗ. Hơn nữa, khi BN đến khám cấp cứu muộn tuy nhiên, ngòi ong thường không được phát hiện để lấy đi hoặc lấy không đúng cách, làm cho nước đục tiếp tục ra từ túi nước tiếp tục thêm vào giác mạc gây tổn thương nặng thêm. Ngoài nguy cơ tổn thương trực tiếp tại giác mạc, nước đục

Nhân mĩt trĩng hĩp viĩm giĩc mĩc do ong đĩt

Viĩt bởi Biên tĩp viĩn

Thĩ bĩy, 01 Thĩng 6 2019 16:45 - Lĩn cĩp nhĩt cũĩ Thĩ bĩy, 01 Thĩng 6 2019 16:56

cĩn gĩy tĩn thĩĩng khĩc nhĩ : Đĩc thĩy tĩn thĩ , glĩcĩm, viĩm mĩng bĩ đĩo trĩĩc, viĩm hĩc vĩĩng mĩc, viĩm thĩ thĩn kĩn, cũ thĩ gĩy mĩ vĩĩn viĩn.



Nĩc ong cũĩ a nhĩĩu thĩn phĩĩn gĩy đĩc cũĩ tĩ cũĩc: melitin (peptit gĩĩm 70 axĩt amin): gĩy tan mĩu, dung giĩĩ hĩĩng cũĩu, biĩĩn đĩĩ đĩĩn thĩ mĩng ỹ thĩĩn kĩn cũĩm giĩc gĩy cũĩm giĩc đĩu; cũĩt lĩĩm vĩ đĩĩĩng bĩo, hyaluronidase vĩ histamine: gĩy giĩĩn mĩĩch, tĩĩng thĩĩt đĩĩch, phĩĩn ỹ ; dopamine: lĩĩm tĩĩm đĩĩp nhĩĩn; apamin: bĩĩt hĩĩĩt bĩĩm canxi ỹ mĩĩng tĩ bĩo, gĩy tĩ lĩĩĩt hĩĩĩt đĩĩng thĩĩn kĩn, cũĩ . Ngoĩĩi tĩc đĩĩng gĩy đĩĩc, nĩc ong cũĩn gĩy rĩ phĩĩn ỹĩng mĩĩĩn đĩĩch vĩĩ đĩĩc tĩ , đĩĩĩkhi vĩĩt đĩĩt gĩy nhĩĩĩm trĩĩng.

Ngĩy sĩu khi bĩĩ ong đĩĩt vĩo giĩc mĩc, đĩĩĩu qĩĩn trĩĩng lĩ phĩĩĩ khĩĩm vĩ phĩĩt hĩĩĩn rĩ ngĩĩĩ ong trĩĩng nhĩ mĩ giĩc mĩc. Nĩĩu cũĩ thĩ phĩĩĩ phĩĩĩu thĩĩĩt đĩĩ lĩĩy ngĩĩĩ ong rĩ. Khi phĩĩĩu thĩĩĩt, cũĩĩĩĩ khĩĩĩn lĩĩĩĩm cũĩĩĩĩ vĩĩ rĩ, trĩĩĩĩĩ gĩy tĩĩn thĩĩĩĩng thĩĩĩĩĩ cho giĩc mĩc.

Nhân mọt trộm ng hủ p viêm giác mạc do ong đốt

Viết bởi Biên tập viên

Thủ quỹ, 01 Tháng 6 2019 16:45 - Lần cập nhật cuối: Thủ quỹ, 01 Tháng 6 2019 16:56

Sau phẫu thuật lấy ngòi ong ra, bệnh nhân cần được tiếp tục điều trị bằng tra mắt với kháng sinh, kháng viêm, giảm đau nếu đau nhiều. Tiên lượng bệnh phụ thuộc vào: số lượng vết đốt (càng nhiều vết đốt thì tiên lượng càng nặng) và thời gian, nếu bệnh nhân đến sớm, được điều trị đúng và kịp thời thì tổn thương tiến triển tốt, giác mạc hết phù nề, thời gian bệnh nhân hồi phục đáng kể. Nếu bệnh nhân đến muộn, ong gây nhiễm độc giác mạc nặng (độc biệt là tổn thương lớp nội mô) sẽ làm cho giác mạc bị đục, gây giảm thị lực trầm trọng.

Nhìn chung, ong đốt vào mắt là mắt tại nạn ít gặp, nhưng nguy hiểm, có thể giảm thị lực vĩnh viễn. Tại nạn hay gặp ở vùng nông thôn, cho nên người dân cần cẩn thận giác, đeo kính bảo hộ khi làm việc ngoài trời nhiều cây cối, hay nơi nghi ngờ có ong làm tổ. Nếu ong đốt vào mắt, nên tìm cách sơ y tế có chuyên khoa mắt càng sớm càng tốt để được chữa trị kịp thời.