

Bs Tr n Lê Pháp -

Đ I C NG:

Ch ng ho i th Fournier là m t căn b nh hi m g p nh ng đe d a tính m ng. Nó là m t b nh nhi m trùng h n h p gây ra b i c h vi khu n hi u khí và k khí. S phát tri n và ti n tri n c a ho i th th ng lên đ n đ nh đ m và có th nhanh chóng gây ra suy đa c quan và t vong.

NGUYÊN NHÂN:

Ban đ u, Fournier đ c đ nh nghĩa là m t th c th t phát, nh ng vi c tìm ki m c n th n s cho th y ngu n lây nhi m trong ph n l n các tr ng h p, là nhi m trùng da t ng sinh môn và b ph n sinh d c. Ch n th ng h u môn tr c tràng ho c ni u sinh d c và đ y ch u, bao g m ch n th ng vùng ch u và đ y ch u ho c can thi p vùng ch u là nh ng nguyên nhân khác c a nó. Các t n th ng th ng g p nh t bao g m đ ng tiêu hóa (30%–50%), ti p theo là đ ng sinh d c (20%–40%) và t n th ng da (20%).

Đ i t ng nguy c :

- Ti u đ ng
- L m đ ng r u
- Suy gi m mi n d ch
- Hóa tr
- S đ ng corticosteroid kéo dài
- HIV
- B nh b ch c u
- B nh lý x gan
- Suy dinh d ng



Vết thương sau mổ 10 ngày



Vết thương sau ra viện 2 tuần

<https://medicine.medscape.com/article/2028889/overview>