

BS Lê Nhật Nam -

TÓM TẮT

Mục tiêu: Báo cáo một trường hợp cấp cứu, can thiệp phẫu thuật hoàn ngoại cẳng chân (VA-ECMO) và quá trình phẫu thuật đặt ống thông i cai ECMO kết hợp xử trí biến chứng huyết khối thành công trên bệnh nhân nguy kịch.

Ca lâm sàng: Bệnh nhân nam, 66 tuổi (N.T.X), nhập viện do tăng huyết áp điều trị bằng Amlodipin liều cao. Bệnh nhân rơi vào tình trạng suy tim cấp và tăng huyết áp tuấn hoàn, không đáp ứng điều trị nội khoa được chuyển nhập can thiệp VA-ECMO cấp cứu. Trong quá trình hỗ trợ huyết động, bệnh nhân xuất hiện biến chứng huyết khối để ng mạch chi dưới. Khi tình trạng cẳng chân đã đáp ứng điều trị khi can thiệp, kíp mổ đã tiến hành phẫu thuật đặt ống thông hai bên bệnh nhân: vừa rút toàn bộ hệ thống cannula (kết thúc ECMO) vừa mổ để ng mạch lấy ra đoạn huyết khối dài 30cm ở trong chi dưới phải.

Kết quả: Lưu thông mạch máu hệ lưu phức hợp tốt, bệnh nhân được ngừng hỗ trợ VA - ECMO an toàn, chuyển khoa Nội Tim mạch tiếp tục điều trị và đã xuất viện vào ngày 22/05/2026.

Kết luận: Hỗ trợ tuấn hoàn ngoại cẳng chân (VA-ECMO) kết hợp với phẫu thuật mạch máu can thiệp đặt ống thông i cai VA- ECMO và xử lý huyết khối) là chỉ định độc đáo, an toàn giúp cứu mạng và bảo tồn chức năng chi cho bệnh nhân sốc tim do ng để c.

[Xem tiếp đây](#)