

Ths. NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH

1. Bệnh viêm gan B là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus viêm gan B gây ra. Người nhiễm virus viêm gan B có thể mắc bệnh viêm gan B hoặc trở thành người mang virus viêm gan B mãn tính và khoảng 25% người mang trùng mãn tính có thể bị chết do xơ gan hoặc ung thư gan.
2. Chưa có thuốc điều trị đặc hiệu để loại bỏ virus viêm gan B khỏi cơ thể. Đối với các trường hợp mãn tính hiện tại, chưa có thuốc điều trị thay thế và rất tốn kém.
3. Việt Nam là vùng có tỷ lệ người mang virus viêm gan B rất cao khoảng 10- 20%, tỷ lệ mang virus viêm gan B phụ nữ có thai trên 10% và trẻ em là 6%.
4. Virus viêm gan B có trong máu, nước bọt, tinh dịch, dịch âm đạo và hầu hết các dịch khác của cơ thể của người mang trùng, lây truyền qua tiếp xúc với máu và các dịch khác của cơ thể.



QUY TRÌNH TIÊM VẮC XIN VIÊM GAN B LIỀU SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN



THỰC HÀNH TIÊM CHỨNG AN TOÀN

Bước 1: Bố trí phòng, bàn tiêm chủng

- Cô phòng tiêm, bàn tiêm vắc xin riêng.
- Đủ ấm cho trẻ sơ sinh.



Bước 2: Khám phân loại trước khi tiêm chủng

Y bác sĩ khám và chỉ định tiêm vắc xin khi trẻ có các dấu hiệu sinh tồn bình thường như ổn định nhịp thở, mạch hồng, bú tốt...



Bước 3: Hướng dẫn chăm sóc tiêm chủng

- Trẻ cần được theo dõi sau khi tiêm 30 phút tại phòng tiêm chủng.
- Hướng dẫn người nhà tiếp tục theo dõi trẻ ít nhất 24 giờ như để ý đến trẻ nhiều hơn, cho trẻ bú.
- Thông báo cho cán bộ y tế ngay khi trẻ có biểu hiện bất thường (sốt, bú ít, tím tái...).
- Đưa trẻ đi tiêm các mũi vắc xin tiếp theo tại cơ sở y tế theo đúng lịch tiêm chủng.

Bước 4: Tiêm an toàn

- Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi tiêm.
- Sử dụng đúng vắc xin VGB đơn giá, 0.5ml tiêm cho trẻ.
- Sử dụng 1 bơm kim tiêm vô trùng (còn hạn sử dụng) cho mỗi mũi tiêm.
- Lắc đều lọ vắc xin trước khi sử dụng.
- Không hút sẵn vắc xin vào bơm kim tiêm.
- Tiêm bắp, mặt ngoài 1/3 giữa đùi.
- Không tiêm vắc xin viêm gan B cùng 1 bên đùi với các thuốc hay vắc xin khác.
- Không đẩy nắp kim tiêm sau khi sử dụng.
- Bỏ ngay bơm kim tiêm đã dùng vào hộp an toàn.







Bước 5: Sau tiêm chủng

- Theo dõi trẻ 30 phút tại cơ sở y tế sau khi tiêm vắc xin.
- Ghi chép thông tin vào phiếu sổ tiêm chủng cá nhân và sổ quản lý tiêm chủng.
- Lưu giữ lọ vắc xin và bơm kim tiêm đã sử dụng trong vòng 2 tuần.
- Tổng hợp và báo cáo kết quả tiêm theo quy định.



Lịch tiêm chủng vắc xin viêm gan B cho trẻ em

Tuổi của trẻ	Lịch tiêm vắc xin VGB
Trẻ sơ sinh	Tiêm vắc xin VGB trong vòng 24 giờ đầu sau khi sinh*
Trẻ 2 tháng tuổi	Tiêm vắc xin DPT-VGB-Hb 1
Trẻ 3 tháng tuổi	Tiêm vắc xin DPT-VGB-Hb 2
Trẻ 4 tháng tuổi	Tiêm vắc xin DPT-VGB-Hb 3


* Chỉ sử dụng vắc xin viêm gan B đơn giá để tiêm liều sơ sinh.



Bảo quản vắc xin viêm gan B

Vắc xin phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C (ngăn mát) trong tủ lạnh năng hoặc phích vắc xin. Không được làm đông băng vắc xin.

Theo dõi và ghi lại nhiệt độ tủ lạnh 2 lần/ngày (sáng, chiều) và 7 ngày/tuần.

Tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau khi sinh là cách tốt nhất phòng lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con