

Một số tình trạng tác dụng của thuốc khi sử dụng

Vị trí biên tập viên

Thứ bảy, 31 Tháng 7 2021 21:09 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 31 Tháng 7 2021 21:16

Ds Drug Therapeutic Hà -

STT	Họ chất	Tương tác	Mức độ	Cơ chế	Hậu quả	Giải pháp
1	Amikacin	Paracetamol	Nguy hiểm	Tăng độc tính trên thận và ảnh hưởng đến gan (paracetamol)	Tăng độc tính trên thận và ảnh hưởng đến gan (paracetamol)	Nên tránh phối hợp, nếu bắt buộc phải dùng nên giảm liều paracetamol và theo dõi chặt chẽ
2	Amiodaron	Digoxin	Nguy hiểm	Liên quan đến độ Digoxin trong máu	Giảm độc tính	Nên giảm liều Digoxin từ 1/3 liều Digoxin ban đầu đến 1/2 liều Digoxin ban đầu và tiếp tục theo dõi chặt chẽ sau 1 tuần 2 tuần, có thể sau 1 tháng từ khi ngừng dùng amiodaron. Tiếp tục theo dõi các dấu hiệu ngộ độc như nôn, buồn nôn, rối loạn nhịp tim
3	Amiodaron	Mexifenacin	Nguy hiểm	Tăng tác dụng ức chế dạ dày	Nguy cơ độc tính trên tim mạch	Chống chỉ định phối hợp
4	Aspirin	Heparin (tổng)	Nguy hiểm	Tăng nguy cơ chảy máu	Tăng nguy cơ chảy máu	Nên tránh phối hợp 2 thuốc, nếu bắt buộc phải dùng nên giảm liều Aspirin và theo dõi chặt chẽ các chỉ số xét nghiệm đông máu định kỳ và biểu hiện xuất huyết trên lâm sàng
5	Aspirin	Ketorolac	Nguy hiểm	Liên quan đến tác dụng phụ của Ketorolac	Tăng nguy cơ loét dạ dày và xuất huyết	Chống chỉ định phối hợp

[Xem tiếp đây](#)