

Lưu ý khi sử dụng Gabapentin

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 29 Tháng 9 2022 10:52 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 29 Tháng 9 2022 10:59

Ds Lê Thị Diễm Uyên -

- Nhóm thuốc: Hôn loạn tâm thần
- Biệt dược: Gabasol, Neurontin, Savigabapentin,
- Dạng thuốc: Viên nang, viên nang cứng, dung dịch uống

1. Gabapentin là gì?

- Gabapentin được sử dụng để giúp kiểm soát các cơn co giật mất phần (co giật) trong điều trị bệnh động kinh. Thuốc này không thay thế cho các loại thuốc động kinh và sẽ chỉ có tác dụng kiểm soát cơn co giật nếu là bệnh tiếp tục dùng thuốc.
- Gabapentin cũng được sử dụng để kiểm soát mức độ nghiêm trọng của đau dây thần kinh sau zona, là cơn đau xảy ra sau bệnh zona.
- Gabapentin hoạt động trong não để ngăn ngừa cơn co giật và giảm đau dữ dội với mức độ nghiêm trọng trong hệ thần kinh. Nó không được sử dụng cho các cơn đau thần kinh xuyên do chấn thương hoặc viêm khớp.



2. Chế độ nh

2.1. Dùng kinh

- Gabapentin được chỉ định nh là để ntr liều trong điều tr các c n dùng kinh c c b có hay không kèm theo các c n toàn th th phát ng i l n và tr em trên 12 tu i. Độ an toàn và hi u qu c a phác đ để ntr liều gabapentin tr em d i 12 tu i còn ch a đ c th t l p.

- Gabapentin được chỉ định nh m t điều tr h tr trong điều tr các c n dùng kinh c c b có hay không kèm theo các c n toàn th th phát ng i l n và tr em t 3 tu i tr lên. Độ an toàn và hi u qu c a phác đ điều tr h tr s d ng gabapentin b nh nh n nhi khoa d i 3 tu i v n ch a đ c th t l p.

2.2. Đau th n kinh:

- Gabapentin được chỉ định điều tr đau th n kinh ng i l n t 18 tu i tr lên. Độ an toàn và hi u qu c a gabapentin b nh nh n d i 18 tu i ch a đ c th t l p.

3. Nh ng c nh báo và bi n pháp phòng ng a :

- Th ntr ng đ i v i b nh nh n có ti n s tr m c m, có ý đ nh t t , suy th n, đ ng, đang dùng thu c khác, tr em đ c bi t d i 3 tu i, trong th i k mang thai và cho con bú.

- Thu c có th gây bu n ng , chóng m t ho c m m t, không lái xe ho c v n hành máy móc trong khi dùng thu c này.

- Nó có th nh h ng đ n l ng đ ng trong máu; theo dõi m c đ ng th ng xuyên.

- B nh nh n có th tăng nguy c có ý đ nh t t ; xem chúng c n th n.

- Theo dõi ch c năng gan, ch c năng th n, và hoàn ch nh s l ng t bào máu th ng xuyên trong khi dùng thu c này.

4. Thông tin dành cho ng i s d ng.

- Báo cho bác sĩ n u b n sai cách, l m d ng ho c l thu c vào thu c, vì điều u này s giúp

bác sĩ cân nhắc liều các thuốc trên có phù hợp với bạn hay không.

- Hãy tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của bác sĩ điều trị, đặc biệt là các hướng dẫn về liều dùng, và tuyệt đối không chia sẻ thuốc của bạn với bất kỳ ai khác. Tuyệt đối không được ngừng uống thuốc đột ngột hoặc tự ý khi tham khảo ý kiến bác sĩ.

- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về các vấn đề nêu trên, hãy trình bày với bác sĩ điều trị. Họ là người có vị trí tốt nhất để cung cấp cho bạn các khuyến cáo lâm sàng dựa trên hoàn cảnh của cá nhân bạn.

5. Thông tin dành cho chuyên gia y tế

- Rà soát tiền sử dị ứng của bệnh nhân để xác định kích thích và dấu hiệu dị ứng hoặc dị ứng thuốc trước khi kê đơn thuốc gabapentin.

- Theo dõi bệnh nhân thận trọng xuyên suốt quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh nhân đang hoặc đã từng sử dụng các opioid và/hoặc các benzodiazepin. Đặc biệt theo dõi việc tăng liều sử dụng hoặc hành vi tìm kiếm thuốc.

- Thận trọng khi kê đơn thuốc gabapentin phối hợp với các opioid do nguy cơ ức chế thần kinh trung ương. Phối hợp với các opioid có thể dẫn tới tình trạng an thần quá mức, ức chế hô hấp, hôn mê và tử vong. Trên các bệnh nhân cần thiết phối hợp gabapentin với các thuốc ức chế thần kinh trung ương, bao gồm cả các opioid, cần phải theo dõi chặt chẽ dấu hiệu ức chế thần kinh trung ương, như lơ mơ, an thần và ức chế hô hấp. Hạn chế liều và thời gian sử dụng tối thiểu để giảm thiểu nguy cơ biến chứng nghiêm trọng như tử vong.

- Đã phát hiện các triệu chứng cai thuốc sau khi ngừng điều trị ngắn hạn hoặc dài hạn trên một số bệnh nhân. Các triệu chứng sau đã được báo cáo: mất ngủ, đau đầu, buồn nôn, lo lắng, tăng tiết mồ hôi và tiêu chảy. Việc ngừng điều trị nên được thực hiện dần dần trong vòng vài tuần để giảm thiểu triệu chứng.

Người tham khảo :

1. <https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/gabapentin-oral-route/description/drg-20064011>
2. <https://www.thuocbietduoc.com.vn/thuoc-goc-389/gabapentin.aspx>
3. https://www.medindia.net/doctors/drug_information/gabapentin.htm
4. <https://www.webmd.com/drugs/2/drug-14208-8217/gabapentin-oral/gabapentin-oral/details>
5. <http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1891/TGA-Khuyen-cao-an-toan-khi-su-dung-pregabalin-va-gabapentin.htm>