


Bs Trần Thị Kiều Loan -

Vancomycin là một loại kháng sinh glycopeptide được phân lập lần đầu tiên vào năm 1953. Đây là một chất kháng khuẩn tự nhiên được tổng hợp bởi vi khuẩn *Amycolatopsis Orientalis*. Vancomycin được sử dụng và được chấp thuận sử dụng vào năm 1958 và nhanh chóng trở thành một loại kháng sinh phổ biến trong điều trị các loài *Staphylococcus* kháng penicillin đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, loại kháng sinh này chưa bao giờ trở thành phương pháp điều trị đầu tay do sinh khả dụng đường uống kém và nhiều tác dụng phụ khác nhau, dẫn đến niềm tin rằng các lựa chọn thay thế ít độc hại hơn có thể có lợi hơn.

Sự xuất hiện của viêm ruột giả mạc, cùng với sự lây lan của *Staphylococcus Aureus* kháng methicillin (MRSA), đã dẫn đến việc sử dụng vancomycin trở lại. Nó được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng do vi khuẩn gram dương có khả năng kháng lại các tác nhân ít độc hại hơn. Đường thuốc uống không hấp thu được sử dụng để điều trị viêm đại tràng màng giả do *C difficile* gây ra. Vancomycin cũng được sử dụng như một biện pháp nhân không dung nạp hoặc dùng với beta-lactam.



Kháng sinh Vancomycin

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 23 Tháng 2 2024 20:39 -

[Xem tiếp tại đây](#)