

Ds Võ Thị Thu -

Canagliflozin là thuốc uống làm giảm lượng đường trong máu (glucose) ở bệnh nhân tiểu đường loại 2. Đây là một loại thuốc trừ tiểu đường mới thuộc nhóm thuốc gọi là thuốc ức chế chất vận chuyển natri-glucose 2 (SGLT2: sodium-glucose co-transporter 2).

Trong điều kiện bình thường, glucose được lọc ra khỏi máu và đi vào ống thận khi máu đi qua thận. Glucose sau đó được hấp thu từ ống thận trở lại máu để glucose không bị mất qua nước tiểu. SGLT2 là một enzyme trong ống thận khi glucose được tái hấp thu từ nước tiểu. Canagliflozin ngăn chặn hoạt động của SGLT2. Do đó, canagliflozin làm giảm tái hấp thu glucose từ ống thận, dẫn đến bài tiết glucose nhiều hơn qua nước tiểu. Canagliflozin đã được FDA chấp thuận vào tháng 3 năm 2013.

Tác dụng phụ của canagliflozin

Các tác dụng phụ thường gặp nhất của canagliflozin là:

- Nhiễm trùng đường tiết niệu
- Nhiễm nấm sinh dục nam và tăng đi tiểu.

Các tác dụng phụ khác của canagliflozin bao gồm: huyết áp thấp, tăng nồng độ kali trong máu, lượng đường trong máu thấp (hạ đường huyết) và tăng cholesterol.

Viết bởi Biên tập viên

<http://www.whodunnit.co.uk/forums/gamagino/47/articles/197/what-are-the-5-ways-to-kill-gamagino>