

Ds Lê Thị Diễm Hiên -

1. Dược động học

Sau khi uống, khoảng 80 - 90% liều uống được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau 2 – 6 giờ sau liều uống dùng. Khoảng 70 - 76% allopurinol được chuyển hóa chủ yếu ở gan thành oxipurinol. Allopurinol và oxipurinol không gắn với protein huyết tương.

Sau khi uống một liều 300 mg, nồng độ cao nhất trong huyết tương của allopurinol khoảng 2 - 3 microgam/ml và của oxipurinol khoảng 5 - 6,5 microgam/ml, có thể tăng lên đến 30 - 50 microgam/ml ở bệnh nhân suy thận.

Nồng độ trong huyết tương của allopurinol khoảng 1 - 3 giờ, của oxipurinol khoảng 12 - 30 giờ, kéo dài rõ rệt ở bệnh nhân suy thận. Cả allopurinol và oxipurinol được liên hợp thành dạng ribonucleoside trong ống thận của chúng.

Lưu ý khi sử dụng thuốc c Allopurinol

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 09 Tháng 9 2024 19:55 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 09 Tháng 9 2024 20:00



[Dược phẩm này](#) được phân phối bởi Công ty TNHH Dược phẩm Watson Việt Nam. [Dược phẩm này](#) được phân phối bởi Công ty TNHH Dược phẩm Watson Việt Nam.