

Ds Trộn Thuốc Kiềm Dị M -

Một số loại thuốc có thể có các tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc vết nuôi, ngay cả khi chỉ dùng với liều nhỏ. Trẻ nhỏ có nguy cơ tác dụng phụ rất cao.

Bác sĩ cần nhắc các chỉ định liều kê đơn an toàn cho bệnh nhân, khi kê đơn các loại thuốc có hại khi sử dụng không đúng cách.

Bác sĩ cần nhắc nhở bệnh nhân:

* Đọc tất cả các loại thuốc xa tầm nhìn và tầm với của trẻ em và vết nuôi

* Không bao giờ chia sẻ thuốc kê đơn với người khác

Mọi gia đình thường gặp trong nhà một số chất, trong đó có thuốc. Thuốc là nguyên nhân phổ biến gây tác dụng ngoài ý muốn ở trẻ em và vết nuôi. Khoảng 20 % các gia đình có trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo báo cáo tác dụng phụ mỗi năm. Tuy nhiên, mọi người ít có khả năng báo cáo tác dụng phụ nếu thuốc không phù hợp, đặc biệt là trong nhà.

Medsafe cũng đã nhận được báo cáo các tác dụng phụ từ vùng do tác dụng kem fluorouracil (5-FU) ở vết nuôi tại New Zealand và nước ngoài. Bộ ng d li u c a New Zealand và thông tin thuốc cho người tiêu dùng (CMI) về Efudix đã được cập nhật lưu ý an toàn cho dùng vết.

Các yếu tố như hàng ngày nguy cơ tác dụng phụ bao gồm loại thuốc, số lượng thuốc, dùng phối hợp nhiều và các đặc điểm của người sử dụng như tuổi, cân nặng, tiền sử bệnh lý. Hầu hết các tác dụng phụ phối hợp nhiều không có hại nghiêm trọng, tuy nhiên một số loại thuốc có thể gây tác dụng nghiêm trọng hoặc tử vong ngay cả với liều rất nhỏ.



[Xem tiếp tại đây](#)