

Ths Bs Trần Thị Minh Thịnh - Nội tiêu hoá

Điểm cần ng




Ung thư dạ dày là nguyên nhân thứ hai gây tử vong do bệnh ác tính trên toàn thế giới và thường được phát hiện ở giai đoạn muộn. Cho đến nay, ung thư dạ dày sớm đang được điều trị bằng các phương pháp xâm lấn tối thiểu như điều trị nội soi và phẫu thuật nội soi, trong khi ung thư tiến triển thì cần xem xét điều trị đa phương thức bao gồm hóa trị, xạ trị và phẫu thuật. Vì vậy, phát hiện sớm ung thư dạ dày điều trị phù hợp là các khuyến cáo quan trọng.

Ung thư dạ dày là căn bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao, nhưng năm gần đây, bệnh ung thư dạ dày có xu hướng trẻ hóa. Hiện nay có phương pháp phòng bệnh tốt, thông tin tuyên truyền tốt hơn so với 15 – 20 năm về trước nhưng số bệnh nhân ung thư dạ dày vẫn tăng lên là do các yếu tố thực phẩm, môi trường có nhiều nguy cơ gây ung thư hơn, do người dân không có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã báo, đến năm 2030 sẽ có khoảng 22 triệu ca mắc ung thư mới và 13,2 triệu ca tử vong. Tỷ lệ mắc ung thư dạ dày thay đổi theo địa lý, ở Việt Nam ung thư dạ dày đứng vị trí thứ 3 và 2 giới.

Cột p nhọt chẹn đoán và đi u tr ung th d dày giai đon sớm

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 0, 19 Tháng 9 2018 15:51 - Lần cập nhật cuối Thứ 0, 19 Tháng 9 2018 16:19



[Xem tiếp tại đây](#)