

Bs Đoàn Hoàng - Khoa Nội Thận-Nội tiết

Thêm bằng chứng rằng hợp vi cấu trúc "thận trọng" metformin ở những bệnh nhân đái tháo đường có bệnh thận tiểu đường loại 2 và bệnh thận mãn tính như đái tháo đường pha phối (CKD) đang nổi lên.

Một phân tích mới về hai nhóm bệnh nhân hội chứng u lỵ Hoa Kỳ cho thấy không có mối liên quan đáng kể giữa liều pháp metformin và nhiễm toan lactic ở những người có thể lọc máu ở mức độ thận (eGFR) thấp nhất là 30 mL / phút / 1,73 m².

Tổ chức nhiễm toan ở người dùng metformin với khoảng eGFR từ 30 đến 44 hoặc 45 đến 59 mL / phút / 1,73 m² có thể so sánh với những bệnh nhân chưa bao giờ được điều trị với metformin, theo Benjamin Lazarus, MBBS, MPH, từ Johns Hopkins Trường Y tế Công cộng Bloomberg, Baltimore, Maryland và các đồng nghiệp.

Trong trường hợp này sau khi kiểm soát các biến số nhiễu như: tuổi tác, tình trạng bệnh lý kèm theo, yếu tố nguy cơ tim mạch, nồng độ bicarbonate huyết thanh, và thuốc điều trị, bao gồm insulin, các tác giả nghiên cứu cho biết trong báo cáo của họ đăng trên JAMA Internal Medicine vào 4/7/2018.

