

Bs Nguyễn Quốc Thái - Khoa Nội TM

Chỉ định (mức I)	
Trong vòng 3h*	Alteplase tĩnh mạch (0.9mg/kg, liều tối đa 90mg trong 60 phút, khởi đầu với bolus 10% liều trong 1 phút) được khuyến cáo cho những bệnh nhân được điều trị trong vòng 3h khi bắt đầu triệu chứng của đột quỵ thiếu máu não hoặc bệnh nhân được nhìn thấy là bình thường gần đây trong vòng 3h. (I A)
Tuổi	Bệnh nhân ≥ 18 tuổi, Alteplase tĩnh mạch trong vòng 3h được khuyến cáo như nhau đối với bệnh nhân <80 và >80 tuổi. (IA)
Mức độ nghiêm trọng	Đối với những đột quỵ nặng, alteplase TM được chỉ định trong vòng 3h từ khi khởi phát triệu chứng. mặc dù tăng nguy cơ chuyển dạng xuất huyết, vẫn có bằng chứng lợi ích lâm sàng cho những bệnh nhân đột quỵ nặng. (I B-R)
	Những bệnh nhân triệu chứng đột quỵ nhẹ nhưng mất chức năng, alteplase TM được chỉ định trong vòng 3h từ khi khởi phát triệu chứng của đột quỵ thiếu máu. Không nên loại trừ bệnh nhân đột quỵ nhẹ nhưng mất chức năng khỏi điều trị alteplase TM vì có lợi ích lâm sàng được chứng minh đối với những bệnh nhân này. (I B-R)
3-4.5h*	Alteplase TM (0.9mg/kg, liều tối đa 90mg trong 60 phút, khởi đầu với bolus 10% liều trong 1 phút) cũng được khuyến cáo đối với những bệnh nhân được lựa chọn có thể điều trị trong vòng 3-4.5h của khởi phát triệu chứng đột quỵ thiếu máu hoặc được thấy bình thường trong thời gian đó.

[Xem tiếp đây](#)