

Chúng tôi gửi lời chào bài viết của PGS.TS Lê Văn Bằng về chuyên đề Hen phế quản và mang thai

Khoa Nội Tổng hợp

Chẩn đoán trình độ phòng và giáo dục hen phế quản quốc gia Hoa Kỳ đã lưu hành những nguyên tắc chđo đđu tiên trong hơn một thập kỷ trong quản lý hen phế quản trong thai kỳ. Báo cáo phđ nđ ánh nhđ ng thuđ c mđ i đđ đđ đđ trình bày và cập nhật nhđ ng khuyđ n cáo đđ u trđ cho nhđ ng phđ nđ mang thai bđ hen phđ quđ n căn cđ trên sđ xem xét lđ i nhđ ng đđ liđ u mđ t cách có hđ thđ ng trên sđ an toàn cđ a nhđ ng thuđ c đđ u trđ hen phđ quđ n trong thai kỳ.

“Những nguyên tắc chđo xem xét lđ i chđ ng cđ trên nhđ ng thuđ c đđ u trđ hen phđ quđ n đđ đđ c sđ đđ ngđ nhđ ng bđ nh nhđ n mang thai” đã đđ đđ trình bày bởi Bác sĩ Barbara Alving, giám đđ c cđ a viđ n Tim, Phđ i và Máu Quđ c gia Hoa Kỳ quđ n lý Chđ đđ ng trình đđ phòng và giáo dục hen phđ quđ n quđ c gia Hoa Kỳ.

Nhđ ng khuyđ n cáo then chđ tđ nhđ ng nguyên tắc chđ đđo vđ thuđ c bao gđ m:

1. Albuterol, mđ t lođ i chđ vđ n beta 2 hít tác đđ ng ngđ n, cđ n phđ i sđ đđ ng nhđ là mđ t lođ i thuđ c làm giđ m cđ n nhanh đđ đđ u trđ triđ u chđ ng hen phđ quđ n. Nhđ ng phđ nđ mang thai bđ hen phđ quđ n cđ n phđ i có thuđ c này có thđ dùng đđ đđ c trong tđ t cđ mđ i lúc.

2. Nhđ ng phđ nđ có nhđ ng triđ u chđ ng ít nhđ t 2 ngày/1 tuđ n hay 2 đđ m/1 tháng là bđ hen phđ quđ n dai đđ ng và cđ n sđ đđ ng thuđ c hđ ng ngày đđ chăm sóc lâu dài hen phđ quđ n và đđ đđ phòng nhđ ng đđ t bđ c phát. Corticosteroid hít là thuđ c đđ đđ c đđ a chuđ ng hđ n đđ kiđ m soát viđ m phđ nđ mang thai bđ hen phđ quđ n dai đđ ng. Nhđ ng nguyên tắc chđ đđo cho thđ y rđ ng có nhiđ u đđ liđ u vđ tính an toàn cđ a sđ sđ đđ ng budesonide trong thai kỳ hđ n là sđ sđ đđ ng nhđ ng lođ i corticosteroid hít khác; tuy nhiên, không có nhđ ng đđ liđ u cho thđ y nhđ ng lođ i corticosteroid hít khác là không an toàn trong thai kỳ, và nhđ ng lođ i corticosteroid hít khác có thđ tiđ p tđ c sđ đđ ng nđ u chúng kiđ m soát mđ t cách có hiđ u quđ nhđ ng bđ nh nhđ n hen phđ quđ n. Nhđ ng thuđ c đđ đđ c sđ đđ ng thêm vào là thuđ c đđ i kháng thđ thđ leukotriene, cromolyn, hay theophylline.

3. Đđ i vđ i nhđ ng bđ nh nhđ n bđ hen phđ quđ n dai đđ ng không đđ đđ kiđ m soát tđ t vđ i corticosteroid hít đđ n đđ c liđ u thđ p, nhđ ng nguyên tắc chđ đđo khuyđ n cáo hođ c tăng liđ u corticosteroid hít hođ c thêm mđ t lođ i thuđ c khác- thuđ c chđ vđ n beta 2 tác đđ ng kéo dài. Ban hđ i thđ m nhđ ng chđ nguyên gia kđ t luđ n rđ ng nhđ ng đđ liđ u không đđ đđ chđ đđ nh mđ t sđ đđ u tiên

Những nguyên tắc chỉ định điều trị Hen phế quản ở phụ nữ mang thai

Viết bởi: Biên tập viên

Thư bày, 18 Tháng 8 2012 10:21 - Lần cập nhật cuối: Thứ ba, 21 Tháng 8 2012 10:23

chẩn đoán lâm sàng thu được trên một loạt thu thập khác.

4. Thuốc corticosteroid uống có thể cần thiết để điều trị hen phế quản nặng. Những nguyên tắc chỉ định cho thấy rằng có những dữ liệu mâu thuẫn về tính an toàn của thuốc corticosteroid uống trong thai kỳ; tuy nhiên, hen phế quản nặng, không được kiểm soát gây nên nguy cơ rõ cho mẹ và con; và sử dụng thuốc corticosteroid uống có thể bỏ lỡ điều trị.