

Nguyễn Đức Khánh – Khoa Chẩn đoán hình ảnh

I. Mục đích:




Hệ thống quản lý là một phần của bệnh sinh để quản lý tiêu hóa thông qua các cơ quan. Tỷ lệ khoảng 1/2.000 - 1/4.000 trẻ sinh sống. Một phần của bệnh sinh là phần đầu tiên của chuỗi các cơ quan sống. Có khoảng 1/3 trẻ sinh sống hệ thống chẩn đoán trước sinh (24 tuần tuổi) như là một phần của chuỗi và không thể y tế dày trên siêu âm. Khoảng 30% trẻ sinh sống hệ thống quản lý bệnh sinh non, có thể có một phần của hệ thống hoặc một phần của hệ thống. Chẩn đoán dựa vào lâm sàng và hình ảnh X quang. Việc chẩn đoán sớm và chính xác để có các xử lý đúng đắn và chuyển nhanh bệnh nhân các trung tâm có khả năng phẫu thuật giúp cho các hệ thống quản lý bệnh sinh cao hơn.

Hệ thống cơ quan bài m sinh và hình ảnh X quang

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 30 Tháng 8 2012 05:20 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 07 Tháng 9 2012 09:25

II. Các hình thái đường tiêu hóa cơ quan




CÁC HÌNH THÁI DỊ TẬT THỰC QUẢN					
Hình thái					
Type	I	II	III	IV	V
Tỉ lệ	5 – 10%	1%	85-95%	< 5%	5-10%
Mô tả	Dị tật không có lỗ dò	Dị tật có một lỗ dò ở đoạn gần	Dị tật có một lỗ dò ở đoạn xa	Dị tật với lỗ dò ở cả đoạn gần và đoạn xa	Dị tật với thực quản không có đoạn teo, một lỗ dò

Hiện tượng này là một dạng dị tật bẩm sinh của ống tiêu hóa (đường ruột) xảy ra khi ống tiêu hóa không phát triển đúng cách. Nó có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, nhưng thường được phát hiện ngay sau khi sinh. Các triệu chứng thường gặp bao gồm nôn mửa, khó nuốt, và thở gấp. Việc chẩn đoán thường dựa trên hình ảnh X-quang và nội soi. Điều trị thường là phẫu thuật để nối lại ống tiêu hóa.

Hội chứng quỵ bẩm sinh và hình ảnh X quang


Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 30 Tháng 8 2012 05:20 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 07 Tháng 9 2012 09:25



duckhanh09@yahoo.com.vn


* Một số hình ảnh X quang tạo thành quỵ bẩm sinh:



Sonde dừng lại trong túi
cùng thực quản đoạn gần

Không có không khí
trong ống tiêu hóa


TYPE I



Hội chứng quèn bẩm sinh và hình ảnh X quang


Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 30 Tháng 8 2012 05:20 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 07 Tháng 9 2012 09:25




Sonde dừng lại trong túi
cùng thực quản đoạn gần

Không có không khí
trong ống tiêu hóa





TYPE I



Sonde dừng lại trong túi cùng thực quản đoạn gần

Khí nhiều trong ống tiêu hóa

TYPE III




Sonde cuộn vòng trong túi cùng thực quản

Thuốc cản quang dừng trong túi cùng thực quản

Rất nhiều không khí trong ống tiêu hóa


TYPE III




Hội chứng quèn bẩm sinh và hình ảnh X quang

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 30 Tháng 8 2012 05:20 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 07 Tháng 9 2012 09:25






Type III kèm dị dạng ống xông

Hệ thống cơ quan bẩm sinh và hình ảnh X quang

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 30 Tháng 8 2012 05:20 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 07 Tháng 9 2012 09:25

Sonde dừng lại
trong túi cùng



Dị tật phổi đi kèm

Teo thực quản đi kèm dị tật phổi bẩm sinh

Thực quản ngắn và dị tật bẩm sinh ở phổi. Hình ảnh X-quang ngực cho thấy thực quản ngắn và dị tật bẩm sinh ở phổi.