

Xốp phổi trong quá trình gây mê phẫu thuật

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 06 Tháng 12 2020 15:58 - Lần cập nhật cuối Chỉnh sửa, 06 Tháng 12 2020 18:35

Bs Lê Tôn Tấn -

1. Định nghĩa:

Xốp phổi trong quá trình gây mê là biến chứng phổi biến có thể nhận thấy ở hơn 90% bệnh nhân trong suốt quá trình gây mê phẫu thuật.

Biến chứng này bắt đầu xuất hiện từ thời điểm khởi mê và vãn hồi từ thêm vài giờ sau khi kết thúc quá trình phẫu thuật.

Việc này có thể dẫn đến viêm phổi, kéo dài thời gian nằm viện, giảm sản sinh surfactant, hoạt hóa chuỗi dây chuyền viêm.

Phần trình bày này sẽ mô tả sự xốp phổi và cách thực hiện kiểm soát đối với những bệnh nhân phổi khỏe mạnh.


Xếp phôi trong quá trình gây mê phẫu thuật

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 06 Tháng 12 2020 15:58 - Lần cập nhật cuối, 06 Tháng 12 2020 18:35



* Các bác sĩ phẫu thuật cần phải tuân thủ các quy định về an toàn trong phòng mổ, bao gồm việc sử dụng đồ bảo hộ đầy đủ, tránh tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, và đảm bảo môi trường vô khuẩn. Việc sắp xếp vị trí của các bác sĩ cũng cần được chú ý để tránh cản trở lẫn nhau và đảm bảo tầm nhìn rõ ràng cho phẫu thuật.



* Các bác sĩ phẫu thuật cần phải tuân thủ các quy định về an toàn trong phòng mổ, bao gồm việc sử dụng đồ bảo hộ đầy đủ, tránh tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, và đảm bảo môi trường vô khuẩn.

* Các bác sĩ phẫu thuật cần phải tuân thủ các quy định về an toàn trong phòng mổ, bao gồm việc sử dụng đồ bảo hộ đầy đủ, tránh tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, và đảm bảo môi trường vô khuẩn.

* Các bác sĩ phẫu thuật cần phải tuân thủ các quy định về an toàn trong phòng mổ, bao gồm việc sử dụng đồ bảo hộ đầy đủ, tránh tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, và đảm bảo môi trường vô khuẩn.