

Bs Nguyễn Ngọc Võ Khoa -

Theo Reuters Health : Nhóm bệnh nhân bị viêm gan B mãn tính có RNA của virus viêm gan B (HBV) trong huyết thanh không thể phát hiện được có thể ngừng điều trị bằng thuốc kháng virus entecavir một cách an toàn, theo một nghiên cứu mới.


"HBV RNA huyết thanh phản ánh một cách trung gian quan trọng trong vòng đời của virus và vì mức độ không thể phát hiện được, bệnh nhân có thể có cơ hội ngừng điều trị", Tiến sĩ Wai-Kay Seto của Đại học Hong Kong, Bệnh viện Queen Mary đã trao đổi với Reuters Health qua email. "Tuy nhiên, nếu HBV RNA trong huyết thanh dương tính, việc tái phát bệnh là điều đáng ngại hơn nếu chỉ có bệnh nhân sau khi ngừng điều trị."

Điều trị kháng HBV lâu dài với liệu pháp tác động lên nucleos (NUC) dẫn đến ức chế virus dai dẳng và giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến gan. Nhóm cũng tiến hành kiểm tra lâm sàng với bệnh nhân sau khi đạt được thành thoi kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg), nhưng vẫn chưa rõ cách tốt nhất để xác định bệnh nhân sẽ ngừng điều trị NUC một cách an toàn.

Mô hình RNA của virus viêm gan B trong huyết thanh có vai trò quan trọng quyết định khi nào nên ngừng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 0, 24 Tháng 3 2021 18:11 - Lần cập nhật cuối Thứ 0, 24 Tháng 3 2021 18:37



<https://bit.ly/3aNUw87>