


BS TR_oN QU_oC CHI_oN *Ngu_on:Harrison's principle of internal medicine*

I/ T_on su_ot và nguyên nhân.

Ung th_o th_oc qu_on không th_ong g_op nh_ong l_oi là b_onh lý ác tính gây t_ovong quá m_oc. Vi_oc ch_on đoán đã đ_oc th_oc hi_on trên 16640 ng_oo i M_o trong năm 2010 và đ_oa đ_on 14500 tr_ong h_op t_ovong. Trên toàn th_o gi_oi, t_on su_ot c_oa ung th_o th_oc qu_on r_ot khác nhau. Nó th_ong x_oy ra trong m_ot ph_om vi đ_oa lý r_ong t_ob_o nam c_oa bi_on Capsi_o ph_ong Tây đ_on phía b_oc Trung Qu_oc_o ph_ong Đông và bao g_om các ph_on c_oa Iran, Trung Á, Afghanistan, Siberia và Mongolia. S_o gia tăng v_o nguy c_o gia đình đã đ_oc th_oy_o nh_ong vùng có t_on su_ot cao m_oc đ_ou s_o liên quan v_o gene thì ch_oa đ_oc xác đ_onh. Các “túi” t_on su_ot cao c_oa b_onh cũng th_ong hi_on đ_on_o nhi_ou đ_oa ph_ong khác nhau nh_o Finland, Iceland, Curaçao, đông nam châu phi và tây b_oc Pháp. Ở B_oc M_o và Tây Âu, b_onh th_ong g_op_o nh_ong ng_oo i da đen h_on ng_oo i da tr_ong và_o nam h_on_o n_o, nó th_ong xu_ot hi_on nhi_ou nh_ot_o tu_oi sau 50 và th_ong liên quan v_o i đ_ou ki_on kinh t_o xã h_oi th_op h_on.



Bảng 91-1. Một vài yếu tố nguyên nhân được tin là có liên quan với ung thư thực quản.

Tiêu thụ rượu quá mức
Hút thuốc lá
Các chất sinh ung thư được đưa vào khác - Nitrate (được biến đổi thành Nitrit) - Hút thuốc phiện - Các độc tố của nấm trong rau chua
Các tổn thương từ các tác nhân vật lý. - Trà nóng - Uống dung dịch kiềm - Các tổn thương hẹp gây ra bởi tia xạ - Bệnh cơ trơn không dẫn mạn tính
Sự cảm nhận của chủ thể
Đường gờ thực quản trong bệnh viêm lưỡi do thiếu vitamin A và thiếu sắt (ví dụ như hội chứng Plummer- Vinson hay hội chứng Paterson-Kelly)
Tăng sừng hóa bẩm sinh và nốt lõm ở gan bàn tay và gan bàn chân (ví dụ như sự tạo chai ở gan bàn tay và gan bàn chân)
Sự thiếu hụt các chất như selen, molipden, kẽm và vitamin A trong chế độ ăn
Bệnh Spru bụng
Trào ngược dạ dày (ví dụ như bệnh thực quản Barrett) gây ung thư biểu mô tuyến.