

Bs Nguyễn Anh Khiêm -

Thai bám sào mồi y thai và tỉ lệ mắc bệnh

Thai bám sào mồi y thai (TBSMLT) là hiện tượng túi thai làm tổ tại vị trí sào mồi y thai trước đó đã từng cung. Đây là hình thái khá hiếm gặp của thai ngoài tử cung. TBSMLT gây biến chứng nặng nề nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời. Bệnh có nguy cơ cao gây vỡ tử cung và băng huyết đe dọa tính mạng người bệnh hoặc phôi chết tử cung khi bệnh nhân còn rất trẻ.

Tỉ lệ mắc sào mồi y của TBSMLT vẫn chưa được biết, bởi vì tình trạng này có thể được chẩn đoán và báo cáo không đầy đủ. Các ước tính của một trung tâm được báo cáo về tỉ lệ mắc bệnh nằm trong khoảng từ 1/1800 đến 1/2656 của tổng số các trường hợp mang thai. Việc tăng cường sàng lọc siêu âm qua âm đạo và nâng cao nhận thức của bác sĩ, có thể góp phần làm tăng tỉ lệ mắc bệnh.


Cách chẩn đoán sinh

Cách xuất hiện TBSMLT chưa được ghi nhận rõ ràng. Có nhiều giả thuyết ghi nhận thích hợp bệnh sinh của TBSMLT, giả thuyết được chấp nhận nhiều nhất là phôi nang đóng vào cổ tử cung qua khe vòi tử cung hay sào mồi y thai hay sào mồi y tử cung. Bởi vì vị trí này là mô xơ nên việc làm tổ ở đây là nguy cơ cho nở tử cung, nhau cài răng lược và băng huyết khi khạc thai lên.

Cấp nhật các khuynh cáo và điểu trị thai bám sào mô lý thai

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh nhật, 13 Tháng 3 2022 20:55 - Lần cập nhật cuối Chỉnh nhật, 13 Tháng 3 2022 21:11



[Xem tiếp tại đây](#)