

Bs Võ Văn Phong -

1. Giới thiệu

Biến chứng phổi sau phẫu thuật (PPCs) là một yếu tố đáng kể dẫn đến kết cục xấu cho các bệnh nhân. Tỷ lệ PPCs từ 2.0% đến 5.6% trong tổng số các phẫu thuật. Gần 25% trường hợp tử vong sau phẫu thuật xảy ra trong tuần đầu tiên có liên quan đến PPCs. Hầu hết các PPCs là nghiêm trọng, có thể tăng tỷ lệ mắc bệnh, tử vong cho các bệnh nhân, nguy cơ nhập viện trở lại và thời gian nằm viện lâu hơn. Với mức độ phổ biến của PPCs và sự gia tăng các phẫu thuật, nghiên cứu về PPC có liên quan với một y tố.

Định nghĩa về PPC khác nhau nhưng bao gồm có thể phát hiện, xác định, đợt cấp của các bệnh phổi mãn tính, nhiễm trùng (viêm phổi quặng và viêm phổi), thuyên tắc kéo dài và suy hô hấp. Các định nghĩa mở rộng của PPCs cũng có thể bao gồm viêm phổi, xác định, có thể phát hiện quặng, đợt cấp của COPD, tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi và các tình trạng khác nhau.

Các chỉ số lâm sàng chủ yếu để giám sát các biến chứng phổi sau phẫu thuật

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 31 Tháng 3 2022 20:22 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 31 Tháng 3 2022 20:25



[Xem tiếp tại đây](#)