


Bs Nguyễn Thị Hải -

Bệnh thần kinh đái tháo đường (ĐTĐ) là biến chứng mãn tính phổ biến nhất của ĐTĐ, cấp 1 và cấp 2, đáng chú ý nhất hàng đầu của bệnh đái tháo đường và bệnh đái tháo đường tuýp 1 và cấp 2, mức độ phổ biến tính vượt quá 50% ở bệnh nhân mắc ĐTĐ. Trong số các dạng bệnh lý thần kinh khác nhau, bệnh thần kinh ngoại biên do ĐTĐ (diabetic peripheral neuropathy - DPN) là bệnh phổ biến nhất và có các biến chứng nguy hiểm liên quan đến các phương pháp điều trị.


Có một số khác biệt về mặt dịch tễ học giữa DPN ở bệnh ĐTĐ cấp 1 và cấp 2, mặc dù không có sự khác biệt lớn về cấu trúc trong bệnh lý thần kinh. Như đã được chứng minh bởi DCCT (Thử nghiệm kiểm soát và tuân thủ bệnh ĐTĐ), tỷ lệ hiện mắc bệnh DPN thấp ở bệnh đái tháo đường cấp 1 mới được chẩn đoán và sớm (thời gian <10 năm). Tỷ lệ hiện mắc sau đó tăng lên theo thời gian mắc bệnh lên đến 34% sau ~ 25 năm, như được ghi lại trong nghiên cứu EDIC (Dịch tễ học và các can thiệp và biến chứng của ĐTĐ). Tỷ lệ tử vong đã được báo cáo trước đó bởi EURODIAB IDDM (Nghiên cứu về các biến chứng phải thu vào insulin ở Châu Âu) ở bệnh đái tháo đường cấp 1 và thời gian tử vong từ 16 quốc gia Châu Âu. Hơn nữa, dữ liệu từ các nhóm thu thập hiện đại phản ánh các tiêu chuẩn chăm sóc hiện tại ở cả hai bệnh Đái Tây Đái cũng cho kết quả tử vong.

Diabetic Peripheral Neuropathy

Healthy Nerves and Blood Vessels




Nerves and Blood Vessels Damaged by DPN





METABOLICALLY HEALTHY

PREDIABETES AND TYPE 2 DIABETES




SÀNG LƯỢNG VÀ CHẨN ĐOÁN DP



Chẩn đoán và điều trị bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường (ADA 2022)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 04 Tháng 4 2022 20:01 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 04 Tháng 4 2022 20:14



Nguồn: Diagnosis and treatment of painful diabetic peripheral neuropathy, ADA 2022