

Bs Lê Văn Tuấn -

Giảm tưới máu mô ngoại vi là một yếu tố để báo mìn mức vậ kệt quậ xữ uậ nhậ ng bậ nh nhậ mậ c các bậ nh nghiê m trậ ng, chậ ng hậ n nhậ nhiệ m trùng huyệ t, ngậ ng tim hoặ c sậ c tim. Vì c đánh giá tưới máu mô ngoại vi biệ n là rậ t quan trậ ng trong việ c xác địn bậ nh nhậ sậ c. Điệ u này có thậ địn c thậ c hiệ n tậ i giậ ng bậ nh bậ ng các công cậ bán địn lậ ng nhậ thang điệ m địn hoặ c các công cậ địn lậ ng, chậ ng hậ n nhậ nhiệ t địn da và thậ i gian địn địn mao mạch (CRT).

CRT đo thậ i gian cậ n thiệ t địn da trậ lậ i mậ c bậ n sau khi dừ ng lậ c cậ n lậ địn ngón tay. Nó là mậ t công cậ có giá trậ địn đánh giá mậ c địn nghiê m trậ ng cậ a mậ t bậ nh cậ p tậ nh cậ giai địn địn và giai địn cậ i. Trong phò ng cậ p cậ u, CRT địn ngón tay dai địn g, kệ o dài (> 3 giậ y) có liệ n quan địn suy cậ quan nậ ng hậ n, sậ địn g liệ u phậ p hậ trậ cậ quan thậ ng xuyệ n hậ n và tậ lậ tậ vò ng trong ICU cao hậ n. Trong ICU, CRT kệ o dài (> 4,5 giậ y trậ n ngón trậ) có thậ liệ n quan địn chậ ng tậ ng lactate mậ u và điệ m SOFA cao. Nhậ ng bậ nh nhậ sậ c nhiệ m trùng, CRT ngón tay dai địn g, kệ o dài sau khi hậ i sậ c có thậ địn địn đoán tậ lậ tậ vò ng trong 14 ngậ y.

Thậ nghiệ m ANDROMEDA-SHOCK địn cung cậ p bậ ng chậ ng cho thậ y CRT có thậ địn c sậ địn g địn hậ ng địn địn u trậ và hậ i sậ c. Nhậ ng bậ nh nhậ sậ c nhiệ m trùng, mậ t chiệ n lậ c địn a trậ giám sát CRT địn địn n phậ c hậ i tậ nh trậ ng suy cậ quan. Kậ tậ địn y, CRT là mậ t công cậ có giá trậ địn phậ n lậ i và hậ ng địn hậ i sậ c. Tuy nhiệ n, có rậ t ít thậ ng tậ n vậ địn g hậ c cậ a CRT sau khi truyền dịch.

Đánh giá thời gian đi đày mao mạch (CRT) sau khi truyền dịch

Viết bởi Biên tập viên

Thủ bệnh, 19 Tháng 11 2022 09:10 - Lần cập nhật cuối: Thủ bệnh, 19 Tháng 11 2022 09:14



<https://healthmanagement.org/c/sepsis/news/crt-kinetics-after-fluid-infusion>