


Bs Nguyễn Đào Cẩm Tú -

Tổng quan

Gastrointestinal stromal tumors (GIST) là u mô đệm đường tiêu hóa thường gặp nhất trong các loại u đường tiêu hóa. Trước đây GIST được xem là u tân sinh có nguồn gốc từ cơ trơn, vì vậy được phân loại như leiomyoma, leiomyosarcoma... Sau đó dựa trên đặc điểm hóa mô miễn dịch đã chứng minh rằng u mô đệm có nguồn gốc thần kinh và không tìm thấy thành phần cơ trơn khác. Vì vậy năm 1983 Mazur và Clark đề nghị dùng “stromal tumors” để chỉ tế bào trung mô có nguồn gốc tế bào hình thoi và biểu mô, đường tính với thụ thể kháng nguyên CD34.

- GIST có 03 loại tế bào khác nhau: tế bào hình thoi chiếm 70%, tế bào biểu mô chiếm 10% và loại hỗn hợp chiếm 20%. Khi GIST gặp mô thần kinh thì được gọi là u thần kinh đường tiêu hóa (GANT).
- GIST dạ dày: thường gặp nhất, được chia thành 4 type chính: u lành và ác tính bào hình thoi, u lành và ác tính bào biểu mô.
- GIST ruột non: đứng hàng thứ 2 sau GIST dạ dày, thường gặp ở tế bào hình thoi, u tế bào biểu mô hiếm gặp. Tỷ lệ GIST ác tính ở ruột non nhiều hơn dạ dày.
- GIST đại tràng: ít gặp, tế bào lành tính thấp, hay gặp tế bào hình thoi và sarcoma vô định hình.
- GIST trực tràng: phần lớn u trung mô là u cơ trơn biệt hóa tế bào cơ trơn lành tính, biệt nguồn từ lớp cơ niêm.
- GIST thực quản: rất hiếm gặp, phần lớn là leiomyoma và thường gặp ở tế bào hình thoi biệt hóa cao. Hoại tử và xâm lấn lớp niêm ít gặp.



Hình 1: U GIST bào cơ bé dạ dày lan vào dây chằng vị - gan, có hoại tử xuất huyết bên trong

U mô đ m ng tiêu hoá

Vi t b i Biên t p viên

Th b y, 10 Tháng 6 2023 07:06 -

(
<http://radiographics.rsna.org/content/23/2>
)

[Xem ti p t i đây](#)