


Bs Đinh Thị Thu Trang -

Thai bám sẹo mổ lấy thai (CSP- Cesarean Scar Pregnancy) là một biến chứng trong đó thai kết bám vào sẹo mổ lấy thai từ lần sinh trước. Tỷ lệ mắc CSP có xu hướng tăng lên cùng với tỷ lệ mổ lấy thai ngày càng cao. Tình trạng này có liên quan đáng kể đến các biến chứng thai kỳ nặng và gia tăng tỷ lệ tử vong mẹ như băng huyết, nhau cài răng lược, vỡ tử cung, nên phát ra những thách thức trong việc chẩn đoán sớm và có kế hoạch quản lý phù hợp.

Siêu âm là công cụ chính để chẩn đoán CSP, mặc dù việc xác định chính xác và kịp thời còn nhiều khó khăn.

Tuổi thai tối ưu để khảo sát, đánh giá thai bám sẹo mổ lấy thai là 6 – 7 tuần. Tuy nhiên khuyến nghị thời điểm áp dụng có thể trong 3 tháng đầu (đến 12 tuần). Đánh giá CSP để khuyến nghị cho tất cả phụ nữ đã từng mổ lấy thai trước đó.

Thủ tục, 03 Tháng 7 2024 14:39 - Liên lạc nhân sự tại Thủ tục, 03 Tháng 7 2024 14:51



Ngư m hình nh Đáo cảo chuyên d d Tai bầy s o m l y thai- Ch đ o tuy n BV T Đ