

Gói MINUTES trong 30 phút đầu tiên của sốc tuần hoàn cấp a phân loại đầu tiên

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 12 Tháng 9 2024 11:45 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 12 Tháng 9 2024 15:24

Bs Đinh Thị Vi -

Sốc tuần hoàn cấp tính là một cấp cứu đe dọa tính mạng đòi hỏi một kế hoạch quản lý hiệu quả và kịp thời, thay đổi tùy theo nguyên nhân sốc và sinh lý bệnh. Hướng dẫn này cung cấp đã được xây dựng cho tình huống sốc; tuy nhiên, cần có một mô hình thời gian rõ ràng để kịp thời thực hiện các can thiệp cấp cứu ngay ban đầu trong những giai đoạn đầu của sốc. Một gói can thiệp đầu tiên, đơn giản có thể tổ chức dựa trên tiêu chuẩn hóa việc quản lý với các mô hình rõ ràng và thời gian cụ thể. Các tác giả đã xuất bản viết tắt "MINUTES" tóm tắt các can thiệp thiết yếu của sốc cấp tính thực hiện trong vòng 30 phút đầu tiên sau khi nhận biết sốc. Tất cả các can thiệp trong gói MINUTES đều phù hợp với bất kỳ bệnh nhân nào bị sốc cấp a phân loại đầu tiên. Ngoài viết tắt, chúng tôi đã xuất bản mô hình thời gian cho tình huống sốc, cân bằng tính khả thi và cấp bách của tình huống can thiệp. Tập viết tắt MINUTES bao gồm sáu bước của sốc cấp tính thực hiện trong 30 phút đầu tiên sau khi nhận biết sốc:

- Maintain "ABCs": Duy trì "ABC"
- INfuse vasopressors and/or fluids (to support hemodynamic/perfusion): truyền thuốc và /hoặc dịch (để hỗ trợ huyết động /tăng máu)
- INvestigate with simple blood tests: Thực hiện các xét nghiệm máu đơn giản
- Ultrasound to detect the type of shock: Siêu âm để phát hiện loại sốc
- Treat the underlying Etiology: Điều trị nguyên nhân
- Stabilize organ perfusion: ổn định tưới máu cơ quan.

