

Giới m ti u c u máu ngo i vi do truy n máu kh i l o ng l n

Vi t b i Biên t p viên

Th năm, 14 Tháng 3 2013 22:21 - L n c p nh t cu i Th sáu, 15 Tháng 3 2013 07:40

Truy n máu kh i l o ng l n (TMKLL) là truy n l n h n ho c b ng 3000ml máu và ch ph m máu trong vòng 24 gi cho cùng m t ng i b nh. Đây là m t ph ng pháp đi u tr h u hi u trong nh ng tr ng h p m t máu c p hay các ph u thu t kéo dài nhi u ti ng đ ng h . Tuy nhiên, máu l u tr th ng hay thi u h t các y u t đông máu và ch a các ch t hoá h c trung gian và các enzyme (gi i phóng ra trong quá trình b o qu n và l u tr máu) nên khi truy n cho ng i b nh v i s l o ng nhi u ch c ch n s gây ra nh ng r i lo n đông c m máu. Giới m s l o ng ti u c u máu ngo i vi cũng là m t trong nh ng bi n ch ng th ng g p do truy n máu kh i l o ng l n.



Giới m s l o ng ti u c u máu ngo i vi sau truy n máu kh i l o ng l n th ng do máu l u tr không còn ti u c u, do hòa loãng máu hay do c ch t m i n d ch.

Nghiên c u trên 30 ng i b nh (13 nam và 17 n) truy n máu kh i l o ng l n t i B nh vi n đa khoa t nh Qu ng Nam t tháng 10/2010 đ n tháng 09/2012, chúng tôi nh n th y s l o ng ti u

Giảm tỉ lệ tử vong máu ngoại vi do truy cập máu khi lập ngân hàng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 22:21 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 07:40

Cửu giảm khác biệt ($p < 0,01$) ở cả hai thời điểm T1 (Ngay sau TMKLL) và T2 (24h sau TMKLL) so với thời điểm T0 trước truy cập máu. Một nghiên cứu của Nguyễn Thị Huệ và Đ. Trung Ph. năm 2008 cũng cho kết quả tương tự.

Điều trị giảm tỉ lệ tử vong máu ngoại vi do truy cập máu khi lập ngân hàng chủ yếu dựa trên máu t. ở toàn phần, chỉ phẩm này vừa bổ sung tỉ lệ tử vong và các yếu tố đông máu, vừa hạn chế được tình trạng giảm tỉ lệ tử vong do hòa loãng máu; do đó, hạn chế các rủi ro liên quan đông chảy máu nói chung và các tai biến của nó.

ThS. BS. Phạm Thị Vĩnh