

Bs Huỳnh Ngọc Tin - Khoa Nội Thận - Nội tiết

1. CÁC KHUYẾN CÁO

1.1. Chăm sóc tiêu chuẩn (Standard care)

OA1. Bệnh nhân dùng thuốc viên hạ đường huyết uống khi thay đổi liều lượng đường huyết nếu không thể duy trì kiểm soát đường huyết ở mức mục tiêu.

Duy trì thay đổi liều lượng trong suốt quá trình sử dụng những loại thuốc này.

Theo dõi mức độ ăn kiêng để duy trì hoặc tăng liều thuốc viên hạ đường huyết uống, theo dõi trong 2-6 tháng.

OA2. Bệnh nhân dùng Metformin trừ khi có chống chỉ định hay nguy cơ suy thận, tăng liều dần sau vài tuần để làm giảm thiểu nguy cơ ngừng thuốc do bất dung nạp qua đường tiêu hóa, ruột.

Theo dõi chức năng thận và nguy cơ suy thận đáng kể (tức để liều creatinin <60 ml/phút/1,73 m²) để ngừng điều trị bằng metformin.



Metformin là một loại thuốc uống được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường type 2. Nó hoạt động bằng cách giảm mức đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Metformin cũng có thể giúp giảm cân và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.