

Ths Bs Lê Thị Thu Trang - Khoa Nhi và Sơ Sinh

ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhiễm Helicobacter Pylori (HP) là nhiễm trùng mạn tính đường tiêu hóa, ước tính có khoảng hơn 50% dân số thế giới nhiễm HP, chủ yếu ở các nước đang phát triển. Ở Việt Nam thuộc vùng có tỷ lệ nhiễm cao, khoảng >70% người trưởng thành. Năm 1983 Warren và Marshall, đã khám phá ra HP là 1 nguyên nhân quan trọng gây viêm loét dạ dày tá tràng và ung thư dạ dày. Đặc tính HP phân bố đường tiêu hóa theo vùng kháng sinh và vị trí liên quan trình tự phân bố kháng sinh khác nhau đối với từng chủng. Tuy vậy sự tiến triển HP vẫn còn là một thách thức hiện nay của y học vì tỷ lệ lây lan hành các chủng đa kháng tăng nhanh trên thế giới.

Trong những năm gần đây, nhu cầu thực nghiệm đã đưa ra những phác đồ điều trị với nhiễm khuẩn HP. Vì vậy mục tiêu của chuyên đề:


+ Đề cập đến các phác đồ điều trị nhiễm HP

+ Thực hành chẩn đoán điều trị nhiễm HP cho một số trường hợp cụ thể.

Cơ chế gây bệnh của *Helicobacter Pylori*

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 17 Tháng 6 2013 20:36 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 17 Tháng 6 2013 20:49



Cơ chế gây bệnh của HP