

Ths Bs Nguyễn Thị Kiều Trinh

Mạch tim đờ o mô tả mạch máu của thai băng qua màng ối nằm trong cơ tử cung và phía dưới của ngôi thai, không được bao bọc bởi nhau thai hoặc dây rốn. Tình trạng này có thể phát hiện sớm bằng siêu âm trong một vài tuần đầu tiên của thai kỳ (mạch tim đờ o loại 1), hoặc một mạch máu chèn giữa bánh nhau chính và bánh nhau phụ (mạch tim đờ o loại 2). Tuy nhiên mức báo cáo trên y văn thay đổi từ 1/2000 đến 1/6000 thai kỳ. Không giống nhau tim đờ o, mạch tim đờ o không gây nguy cơ chính cho mẹ nhưng liên quan có ý nghĩa với nguy cơ cho thai nhi. Khi màng ối bị vỡ tự nhiên hoặc do bệnh lý, các mạch máu thai nhi không được bao bọc và gây chảy máu xuất huyết. Mạch tim đờ o thường có biểu hiện chảy máu tử cung khi đi khám và bất thường như nhịp tim thai nhi như nhịp giảm, nhịp tim chậm, nhịp hình sin hoặc mất nhịp tim thai. Tỷ lệ tử vong trong tình huống này khoảng 60%, mặc dù tỷ lệ sống sót của thai nhi đáng kể đến 97% đã được báo cáo nếu đã thực hiện chẩn đoán sớm. Rút huyết khi chảy máu mà không kèm theo vỡ ối. Vì lưu lượng máu thai nhi là khoảng 80-100 ml / kg, nên mất một lượng máu tử cung đôi khi có thể ảnh hưởng đến việc nuôi thai nhi, vì thế phải kích thích cuộc đẻ nhanh chóng và hồi sức tích cực bao gồm các biện pháp như truyền máu. Rút huyết khi bất thường như nhịp tim của thai nhi trong trường hợp không có xuất huyết có thể xuất hiện theo phát do sự chèn ép mạch máu thai nhi bởi ngôi thai.

Yếu tố nguy cơ mạch tim đờ o bao gồm bất thường bánh nhau như bánh nhau 2 thùy hoặc có bánh nhau phụ trong đó mạch máu chèn giữa 2 thùy riêng biệt, tim sống nhau bám thấp trong quý II thai kỳ, đa thai, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tỷ lệ mạch tim đờ o cao khoảng 1/ 300. Nguyên lý do cho sự kết hợp này là không rõ ràng, nhưng liên quan đến sự làm tổn thương của túi phôi khi cấy hoặc gia tăng sự thay đổi về hình thái của bánh nhau trong IVF.

Môch ti n đ o

Vi t b i Biên t p viên

Th năm, 04 Tháng 7 2013 21:22 - L n c p nh t cu i Ch nh t, 07 Tháng 7 2013 15:08

