

BS Trần Văn Thành và CS

Mục tiêu: Đánh giá tính khả thi của phẫu thuật nội soi sau phúc mạc để xử lý sỏi niệu quản và cắt bỏ nang thận dưới gây tê tê y số ng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2012, có 7 bệnh nhân đi mổ sỏi ASA I hoặc II được mổ nội soi sau phúc mạc để xử lý sỏi niệu quản và cắt bỏ nang thận dưới gây tê tê y số ng tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Kết quả: Tất cả các trường hợp đều thực hiện thành công bệnh nhân nội soi sau phúc mạc dưới gây tê tê y số ng.. Thời gian mổ trung bình 58,25 phút (35- 120). Điểm đau trung bình theo thang điểm VAS sau mổ 4 giờ : 1,5 (1-3), 8 giờ : 2,5 (1-4), 12 giờ : 1,7 (1-3), và thời điểm 24 giờ là 1 (0-2). Thời gian nằm viện sau mổ trung bình 5,28 ngày (4-7 ngày). Tất cả các trường hợp đều hồi phục nhanh chóng và sau mổ.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc để xử lý sỏi niệu quản dưới gây tê tê y số ng hoặc cắt bỏ nang thận dưới gây tê tê y số ng là khả thi và hiệu quả cho bệnh nhân được mổ nội soi.



Hình minh họa

Vi t b i Bi n t p vi n

Th  ba, 18 Th ng 2 2014 17:16 - L n c p nh t cu i Th  ba, 18 Th ng 2 2014 17:39

[M i c c b n xem ti p to n v n t i đ y](#)