

Cửu sản ng m t b nh nhân b đ t qu nguy k ch

Vi t b i Biên t p viên

Th ba, 06 Tháng 4 2021 18:44 - L n c p nh t cu i Th ba, 06 Tháng 4 2021 18:54

Bs Đ ng Ng c Thành -

Ngày 4 tháng 4 năm 2021, B nh vi n đa khoa t nh Qu ng Nam đã c u s ng m t b nh nhân b nh i máu não trong tình tr ng nguy k ch, đe d a t vong.

B nh nhân: Võ Văn C. 65 tu i.

Đ a ch : xã Tam Hòa, huy n Núi Thành, t nh Qu ng Nam.

Vào vi n lúc 11 gi 48 phút ngày 04/4/2021.

Lý do vào vi n: Hôn mê sâu.

B nh s : Theo l i ng i nhà khai, b nh nhân có ti n s tăng huyết áp, cách lúc nh p vi n kho ng 1 gi , sau khi ăn xong đi vào nhà v sinh thì b nh nhân lo ng cho ng r i ngã xu ng, méo mi ng, nôn, mê sâu. Ng i nhà g i xe ô tô ch vào khoa C p c u, b nh vi n đa khoa t nh Qu ng Nam.

Ghi nh n t i khoa C p c u: Huyết áp 130/80mmHg; Glasgow (E1V2M4) = 7 đi m (thang đi m Glasgow đ đánh giá tri giác c a b nh nhân, 15 đi m là bình th ng, 7 đi m là hôn mê sâu); b nh nhân tăng ti t, khó th , li t hoàn toàn ½ ng i bên ph i. Kíp tr c c p c u xác đ nh b nh nhân n ng, r t có th b nh i máu não gi th 2 (đang trong kho ng “gi vàng” đ c p c u). Nên song song v i các bi n pháp c p c u, chúng tôi kh i đ ng quy trình “báo đ ng đ ” n i vi n.

B nh nhân đ c đ i ch p C t l p vi tính (CLVT) s não ngay, c bác sĩ c p c u và bác sĩ tiêu s i huyết đ u có m t t i phòng ch p CLVT, khi th y không có hình nh xu t huyết não trên phim ch p, chúng tôi đã gi i thích nhanh cho thân nhân đ ng ý và ti n hành tiêu s i huyết ngay v i thu c Alteplase 50mg.

Cửu sống mới bệnh nhân bị đứt quai nguy kịch

Vị trí bệnh nhân Biên tập viên

Thứ ba, 06 Tháng 4 2021 18:44 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 06 Tháng 4 2021 18:54



Bệnh nhân trở lại khi dùng thuốc bổ liều thấp dần và hôn mê sâu

Sau khoảng 10 phút dùng thuốc thì bệnh nhân tỉnh lại, có thể ngẩng đầu, tay chân bên phải, sau 30 phút thì bệnh nhân tỉnh lại, tỉnh táo, tỉnh lại và tay chân bên phải dần lên

Cử u song mọt bệnh nhân bị đột quỵ nguy kịch

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ ba, 06 Tháng 4 2021 18:44 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 06 Tháng 4 2021 18:54

bình thường ng nh bên trái. Tất cả bác sĩ, điều dưỡng và người nhà chăm sóc kiên nhẫn chờ đợi, vì khi vào viện bệnh nhân mê sâu tình trạng không qua khỏi thì đã hỏi phác đồ điều trị ngoại viện. Quá trình theo dõi tại khoa Cấp cứu không có biến chứng gì, sau đó bệnh nhân được chuyển vào khoa Nội tim mạch tiếp tục điều trị và diễn biến tốt dần dần trong vài ngày tiếp theo.



Bệnh nhân sau khi dùng thuốc Alteplase khoảng 10 phút



Bệnh nhân sau khi dùng thuốc Alteplase khoảng 30 phút

Đây là một trong những bệnh nhân bị nhồi máu não nặng được cứu sống mà không để lại di

chúng tôi Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. Có được kết quả như trên là nhờ:

- Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện kịp thời (dưới 3 giờ kể khi khởi phát bệnh).
- Bệnh nhân được đưa thẳng tới cơ sở có khả năng chẩn đoán và thực hiện tiêu sợi huyết mà không qua các cơ sở trung gian khác nên không mất “thời gian vàng”.
- Kịp thời cấp cứu đã khai thác kỹ bệnh sử, thời gian khởi phát bệnh để khởi động quy trình “báo động đỏ” kịp thời.
- Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã được huấn luyện về chẩn đoán và xử trí đột quỵ, thái độ làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp, có trách nhiệm cao.

Qua đây, chúng tôi khuyến cáo rằng, tất cả bệnh nhân, bất kể là tuở nào khi có biểu hiện đột quỵ (tê, liệt tay chân, méo miệng, nói không rõ, sụt giảm tri giác...) thì nhanh chóng đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam (số 01, Nguyễn Du, Tam Kỳ) bất kể thời gian nào chúng tôi đều ưu tiên tiếp nhận và điều trị để cứu bệnh nhân, vì **thời gian là não**”.