

Tric khuẩn phong

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 14:35 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 14:49

I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC

Tric khuẩn phong (hỏi) được Hansen người Na Uy tìm ra năm 1874 ở Novergia.


1. Hình thái-bắt màu

- Vi khuẩn có hình que nhỏ vi khuẩn lao nhưng to hơn, không có lông, vỏ và nha bào.

- Bắt màu đỏ theo phương pháp nhuộm Ziehl - Neelsen, sắp xếp thành từng đám giống như bó củi. Vi khuẩn dễ bị mất màu bởi alcol acid hơn vi khuẩn lao.

- Cấu trúc: Giống vi khuẩn lao, giàu lipid cho nên kháng lại alcol- acid.

Ngoài ra có thêm acid mycolic, acid leprosinic.



Đã gửi kèm theo file ảnh chụp vi khuẩn Bacillus anthracis trên slide trình bày nội dung bài báo. Các bạn vui lòng kiểm tra và xác nhận để tôi có thể gửi tiếp các tài liệu liên quan. Cảm ơn các bạn rất nhiều.