

CN Nguyễn Vũ Huyền Trang -

CEA là một phân tử được glycosyl hóa cao có trọng lượng phân tử khoảng 180 kDa. CEA giống như AFP, thuộc về nhóm kháng nguyên ung thư bào thai được tạo ra trong thời kỳ phôi và bào thai. CEA được cho là đóng vai trò trong một số quá trình sinh học bao gồm sự kết dính, miễn dịch và sự chết theo chương trình của tế bào. Sự hình thành của CEA bắt đầu ngay sau khi sinh, và biểu hiện ở mức thấp trong mô người bình thường. Vì vậy nồng độ CEA rất thấp trong máu của người bình thường. Nồng độ CEA cao thường được tìm thấy trong các trường hợp ung thư tuy nhiên để tránh.


Đo nồng độ CEA trước khi phẫu thuật là mong muốn giá trị này có thể cung cấp thông tin chẩn đoán để lập, giúp theo dõi phẫu thuật và cung cấp một giá trị nền cho các xác định theo sau. Bệnh nhân giai đoạn II và III, nồng độ CEA nên được đo mỗi 2-3 tháng trong ít nhất 3 năm sau khi chẩn đoán. Để theo dõi diễn biến của bệnh tiến triển, nên kiểm tra nồng độ CEA mỗi 2-3 tháng.

Xét nghiệm máu để tìm kiếm CEA

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 02 Tháng 4 2024 11:13 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 02 Tháng 4 2024 15:16

Tumor markers



[Xem tiếp tại đây](#)