

Bs Lê Trung Nghĩa -

M i ng i đ u có hai lo i gen ung th vú “BRCA” trong m i t bào c a c th . Khi ho t đ ng bình th ng, BRCA1 và BRCA2 s s a ch a DNA, gi cho các gen khác kh e m nh và ngăn ng a nh ng thay đ i gây ung th trong t bào.

Khi đ t bi n làm h ng m t trong hai gen này, nguy c ung th c a ng i đó s tăng lên. Vi c th a h ng các b n sao b h ng c a gen BRCA1 ho c BRCA2 có th làm tăng nguy c ung th vú và ung th buồng tr ng p h n và nguy c ung th vú và tuy n ti n li t nam gi i, cũng nh các lo i ung th khác.

D i đây là nh ng đi u b n c n bi t v các y u t di truy n trong b nh ung th vú, nh ng ng i có th có nguy c m c b nh và cách nh ng ng i có đ t bi n BRCA có th làm vi c v i bác sĩ c a h đ b o v ch ng l i b nh ung th

Thứ năm, 11 Tháng 7 2024 10:14 - Liên lạc phẩm tuệ Thứ năm, 11 Tháng 7 2024 10:22



<https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/>