

Bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới và những điều cần lưu ý

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 25 Tháng 9 2024 16:50 -

Ds Đặng Thị Ngọc Hà -

Bệnh giãn tĩnh mạch chi dưới gây nên bởi sự hình thành các van trong lòng tĩnh mạch, làm cho máu chảy theo một chiều trái ngược với thông thường. Thay vì được bơm từ bàn chân lên tim, máu sẽ đi theo chiều ngược lại làm tăng áp lực trong lòng tĩnh mạch dưới tác động của trọng lực kéo giãn thành tĩnh mạch. Thêm vào đó khi các tĩnh mạch giãn, sẽ kéo các van và làm cho tình trạng hở các van thêm nặng thêm, làm cho dòng chảy ngược càng thêm. Hậu quả là làm tăng áp lực trong tĩnh mạch, gây nên tình trạng viêm tĩnh mạch, giãn các tĩnh mạch kèm theo các biến chứng khác.

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới còn được gọi là suy giãn tĩnh mạch chân. Đây là căn bệnh gây đau đớn, cản trở sinh hoạt và có thể gây ra những biến chứng như huyết khối và tính năng ngược dòng máu. Ngoài việc thực hiện các biện pháp điều trị thì người bệnh cần lưu ý:



[Xem tiếp tại đây](#)